

Cerutin, niedobór witaminy C i rutozyłu, 125 tabletek



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfarmex
Substancja czynna	Acidum ascorbicum, Rutosidum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Cerutin - 125 tabletek powlekanych

Opis produktu:

- Rutyna i kwas askorbowy (witamina C) zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę naczyń krwionośnych. Rutozyd przedłuża działanie witaminy C, opóźniając jej utlenianie.

Skład:

- Substancjami czynnymi leku są kwas askorbowy i rutozyd trójwodny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian.
- Otoczką: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jedna tabletkę zawiera 100 mg kwasu askorbowego i 25 mg rutozydu trójwodnego.

Wskazania:

Lek wskazany jest do stosowania:

- w stanach niedoboru witaminy C i rutyny - wspomaganie odporności organizmu;

- w uszczelnianiu naczyń włosowatych - zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Doustnie.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C:

- 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Dzieci i młodzież

Profilaktycznie:

- w wieku do 12 lat: 1 tabletką na dobę
- w wieku od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C:

- w wieku do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę
- w wieku od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Należy stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Cravisol

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą powodować zakwaszenie moczu, a w konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów, cytrynianów wapnia w drogach moczowych.
- Po stosowaniu dużych dawek witaminy C mogą 3 również wystąpić: nudności; wymioty; niestrawność; biegunka; wysypka; ból głowy

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nasilenie działania i toksyczności doustnych leków przeciwkrzepliwych pochodnych warfaryny oraz sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii).
- Witamina C w dawkach większych niż 1g na dobę może zmniejszyć skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i aminoglikozydów.
- Długotrwałe stosowanie rutyny nasila działanie niesteroidowych leków 2 przeciwzapalnych.
- Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.
- Duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w płytkach krwi osocza

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cerutin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą.
- Nie należy stosować jednocześnie z sulfatiazolem.
- Witamina C w dużych dawkach może powodować nasilenie wydalania kwasu szczawowego, dnę, kamice mocznicową, cystynurię, hipokaliemię, hiperkalcemię.

Ciąża i karmienie piersią

- W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Cerutin zawiera laktozę

- Lek zawiera laktozę (jedna tabletkowa powlekana zawiera 1,90 mg laktozy). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.