

Cholinex bez cukru x 24 pastylki



Cena: 26,20 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------|
| Producent / Marka | GlaxoSmithKline |
| Substancja czynna | Cholini salicylas |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Cholinex bez cukru pastylki na ból gardła - 24 pastylki twarde

(Cholini salicylas)

Produkt nie zawiera cukru.

Opis produktu:

Cholinex to lek do stosowania podczas stanów zapalnych gardła oraz towarzyszącemu im bólowi. Może być przyjmowany również podczas antybiotykoterapii przy zakażeniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje.

Skład:

- Substancja czynna - salicylan choliny (Cholini salicylas)
- Substancje pomocnicze - izomalt, malitol ciekły, aspartam (E 951), acesulfam potasowy, olejek miętowy

1 pastylka zawiera 150 mg salicylanu choliny

Wskazania:

- stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła

- ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym
- jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła

Działanie:

- przeciwbólowe i przeciwzapalne
- salicylan choliny zmniejsza obrzęk, przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Zwiększa również wydzielanie śliny, co wspomaga działanie przeciwzapalne

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia:

- ssać po jednej pastylce co 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę)

Jeżeli ból gardła nie ustąpi w ciągu 1 do 2 dni, należy skonsultować się z lekarzem

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania:

nie należy stosować w przypadku:

- uczulenia na substancję czynną – salicylan choliny, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- gdy pacjent cierpi na żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem)
- karmienia piersią

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, wysypka, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu, trudności w oddychaniu)
- uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, krwawienia)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zespół Rey'a u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- zastosowanie leku skonsultować z lekarzem w przypadku: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, astmy oskrzelowej

Ciąża, karmienie piersią:

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Cholinex może wchodzić w interakcje z:

- innymi lekami NLPZ (osłabienie ich działania)
- lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwcukrzycowymi
- przeciwzakrzepowymi
- steroidowymi lekami przeciwzapalnymi
- lekami przeciwzakrzepowymi
- fibrynolitycznymi
- lekami hamującymi agregację płytek

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG. Stadastrasse 2–18 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Lek bez recepty
Cholinex bez cukru pastylki na ból gardła - 24 pastylki twarde

(Cholini salicylas)

Produkt nie zawiera cukru.

Opis produktu:

Cholinex to lek do stosowania podczas stanów zapalnych gardła oraz towarzyszącemu im bólowi. Może być przyjmowany również podczas antybiotykoterapii przy zakażeniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje.

Skład:

Substancja czynna - salicylan choliny (Cholini salicylas)

Substancje pomocnicze - izomalt, malitol ciekły, aspartam (E 951), acesulfam potasowy, olejek miętowy

1 pastylka zawiera 150 mg salicylanu choliny

Wskazania:

stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła

ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym

jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła

Działanie:

przeciwbólowe i przeciwzapalne

salicylan choliny zmniejsza obrzęk, przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Zwiększa również wydzielanie śliny, co wspomaga działanie przeciwzapalne

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia:

ssać po jednej pastylce co 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę)

Jeżeli ból gardła nie ustąpi w ciągu 1 do 2 dni, należy skonsultować się z lekarzem

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania:

nie należy stosować w przypadku:

uczulenia na substancję czynną – salicylan choliny, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

gdy pacjent cierpi na żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem)

karmienia piersią

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, wysypka, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu, trudności w oddychaniu)
uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, krwawienia)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

zespół Rey'a u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

zastosowanie leku skonsultować z lekarzem w przypadku: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, astmy oskrzelowej

Ciąża, karmienie piersią:

w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Cholinex może wchodzić w interakcje z:

innymi lekami NLPZ (osłabienie ich działania)
lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwcukrzycowymi
przeciwzakrzepowymi
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi
lekami przeciwzakrzepowymi
fibrynolitycznymi
lekami hamującymi agregację płytek

Przechowywanie:

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2–18 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.