

Cholinex Intense, smak, jeżynowy, ból, zapalenie, gardła, 20 tabletek

Cena: 26,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Stada
Substancja czynna	Hexylresorcinolum, Benzalkonium
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Cholinex Intense, tabletki do ssania, jeżyna - 20 sztuk

(Hexylresorcinolum, Benzalkonium)

Opis produktu:

Lek Cholinex Intense w postaci tabletek do ssania o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Smak jeżynowy

Skład:

Substancje czynne: 2,5 mg heksylresorcynolu, 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.

Substancje pomocnicze - sacharoza granulowana i płynna glukoza (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, kwas cytrynowy jednowodny, aromat jeżynowy 500948E, czerwień koszelinowa (E124), czerń brylantowa (E151)

1 pastylka zawiera: 2,5 mg heksylorezorcynolu, 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.

Wskazania:

- Tabletki do ssania **Cholinex Intense** stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

Działanie:

- Tabletki do ssania **Cholinex Intense** zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

- Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 7 lat

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

W razie utrzymania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku wrażenia iż działanie leku jest za słabe lub za mocne należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

- Jeśli występuje nadwrażliwość na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.
- Jeśli występuje nietolerancja niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy)
- Lek zawiera sacharozę i glukozę, cukier inwertowany. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję glukozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Jedna tabletkę zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą przyjmujących więcej niż 4 pastylki na dobę.
- Lek zawiera mniej niż 1mmol (23mg)sodu na pastylkę , to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

- Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 7 lat
- Lek zawiera sacharozę i glukozę, cukier inwertowany. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję glukozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Jedna tabletkę zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą przyjmujących więcej niż 4 pastylki na dobę.
- Lek zawiera chlorek benzalkoinowy, który może powodować miejscowe podrażnienie.
- Lek zawiera 10,68 glikolu propylenowego.
- Lek zawiera siarczany. Może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.
- Lek zawiera aromaty jeżynowy z d-limonem, d-dipentenen oraz linalolem, które mogą powodować reakcje alergiczne.
- Lek zawiera barwniki azowe (czerwień koszelinową i czerń brylantową). Może powodować reakcje alergiczne
- Lek zawiera siarczany. Może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.
- Nie stosować dawki większej niż zalecana.
- W razie utrzymania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku wrażenia iż działanie leku jest za słabe lub za mocne należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Nie stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować w wieku poniżej 7lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie stwierdzono wpływu leku Cholinex Intense na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholinex Intense z innymi lekami

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG.Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.