

Clatra Allergy 20 mg x 10 tabletek alergologia, katar sienny



Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Menarini Berlin-Chemie

Substancja
czynna Bilastinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Clatra Allergy 20 mg lek przeciwalergiczny - 10 tabletek

(Bilastinum)

Opis produktu:

Lek **Clatra Allergy** zawiera substancję czynną **bilastyne**. Jest stosowany w celu złagodzenia objawów kataru siennego (kichanie, świąd, katar, zatknięty nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych postaci alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Może on być również stosowany do leczenia swędzących wysypek skórnych

Składniki:

- Substancja czynna - Bilastinum
- Substancje pomocnicze - celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Jedna tabletkę zawiera 20 mg bilastyny

Wskazania:

- **Bilastyna** jest wskazana do objawowego leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki

Działanie:

- Clatra Allergy jest lekiem o działaniu przeciwhistaminowym
- Bilastyna jest niesedatywnym, długo działającym antagonistą histaminy z selektywnym powinowactwem do obwodowych receptorów H1

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- tabletkę należy przyjmować doustnie jedną godzinę przed lub dwie godziny po posiłku lub wypiciu soku owocowego
- tabletkę należy połykać popijając szklanką wody
- zalecana dawka u dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 12 lat i powyżej, to 1 tabletkę (20 mg) na dobę

Leku Clatra Allergy nie należy przyjmować razem z jedzeniem ani z sokiem grejfrutowym, ani innymi sokami owocowymi, ponieważ osłabia to działanie leku

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie stosować leku:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- najczęściej to senność, bóle głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność zwłaszcza u pacjentów z:

- zaburzeniami czynności nerek należy unikać wtedy jednoczesnego podawania bilastyny

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje:

- ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy), erytromycyna i ryfampicyna (antybiotyki), diltiazem (lek stosowany w dławicy piersiowej),

cyklosporyna (lek stosowany w celu zmniejszenia aktywności układu odpornościowego, co pozwala uniknąć odrzucenia przeszczepu, lub w celu zmniejszenia aktywności choroby w przypadku chorób autoimmunologicznych i alergicznych, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry lub reumatoidalne zapalenie stawów)

- Rytonawir (lek stosowany w leczeniu AIDS)

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Decyzję o zastosowaniu leku w ciąży lub okresie karmienia piersią podejmuje lekarz

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży wieku poniżej 12 roku życia

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.