

Clisma Lax lewatywa, wlewka doodbytnicza 133 ml



Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	AVEC PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny jednorazowego użytku

Clisma Lax wlewka doodbytnicza - 133 ml

Opis produktu:

Clisma Lax to środek przeczyszczający na bazie soli fizjologicznej, wywiera działanie osmotyczne w jelicie cienkim przez pobieranie wody do światła jelita, powodując rozszerzenie i pobudzenie perystaltyki jelit i w konsekwencji oczyszczanie jelita.

Wskazania:

Przy zaparciach oraz do oczyszczania jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, radiologicznymi, urologicznymi, ginekologicznymi i kolonoskopowymi.

Skład:

Butelka 133ml zawiera roztwór w przeliczeniu na 100 ml: diwodoroortofosforan sodu (NaH_2PO_4) 13,91g; wodoroortofosforan sodu (Na_2HPO_4) 3,18g; wodorotlenek sodu; benzoesan sodu, parahydroksybenzoesan metylu, woda destylowana w ilości dopełniającej do 100 ml.

Przeciwwskazania:

- Clismalax jest przeciwwskazany u pacjentów dializowanych.
- Przeciwwskazaniem są także zaburzenia, które mogą przedłużyć czas przebywania roztworu w jelicie, takie jak: rozdzięcie okrężnicy (megacolon), niedrożność lub zwężenie jelit, kamienie kałowe.
- Clismalax jest również przeciwwskazany w hemoroidach, w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych jelit oraz w przypadku występowania nudności, wymiotów i bólu brzucha.

Sposób użycia:

1. Zdejmij nasadkę ochronną z kaniuli doodbytniczej;
2. Chwyć butelkę i delikatnie wprowadź kaniulę do odbytnicy w kierunku pępka, a następnie wyciśnij ją do końca. Niewielka część płynu może pozostać w butelce. U dzieci kaniulę wprowadzić do maksymalnie połowy jej długości;
3. Po wyciśnięciu płynu wyjmij kaniulę, umieść pustą butelkę w tym samym kartoniku i wyrzuć.
4. Pozostań w pozycji leżącej przez około 5 minut, do chwili odczucia potrzeby wypróżnienia;
5. Nie ma potrzeby przetrzymywania lewatywy dłużej niż 5 minut. Nawet przy braku parcia na stolec należy podjąć próbę wypróżnienia, ponieważ podany roztwór powinien być wydalony w możliwie jak najkrótszym czasie.

Uwagi:

- Clismalax należy stosować możliwie najrzadziej, jedynie w razie konieczności.
- Stosowanie przez dłuższy czas jedynie ze wskazań lekarskich.
- Nie należy stosować w przypadku nudności, wymiotów, bólów brzucha, niedrożności lub zwężenia jelit, krwawienia z odbytu.

Ważne:

- Wyrób medyczny posiada certyfikat CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.