

# Clotrimazolum Hasco, krem 20 g



Cena: 4,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Clotrimazolum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Clotrimazolum Hasco, 10mg/g krem - 20 g

(Clotrimazolum )

## Opis produktu:

Clotrimazolum HASCO to lek w postaci białego kremu do stosowania na skórę. Substancją czynną produktu leczniczego jest klotrymazol - działający miejscowo środek przeciwgrzybiczy. Lek Clotrimazolum HASCO ogranicza rozwój większości grzybów wywołujących zakażenia skóry u ludzi.

## Skład:

1 g kremu zawiera:

- substancję czynną - 10 mg klotrymazolu,
- substancje pomocnicze - sorbitanu stearynian, polisorbát 60, palmitynian cetylu, alkohol cetostearylowy, alkohol benzylowy, oktylododekanol, woda oczyszczona.

## Wskazania:

- grzybica skóry rąk i stop, tułowia, podudzi i nóg wywołanych przez dermatofity

- łupież pstry
- zakażenia skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołądzi) wywołanych przez drożdżaki (zakażenia takie zwane są także kandydozami)

## Działanie:

- przeciwgrzybicze

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- 2 do 3 razy na dobę nanieść cienką warstwę leku na zmienione chorobowo miejsca i delikatnie go w nie wcierać.
- Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, lek należy stosować jeszcze co najmniej przez miesiąc.
- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- ciąża
- laktacja
- klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu, a tym samym osłabiać ich skuteczność

## Działania niepożądane:

Z częstością nieznaną mogą wystąpić:

- reakcje uczuleniowe takie jak: duszności, zbyt niskie ciśnienie krwi, omdlenie, pokrzywka
- reakcje miejscowego podrażnienia skóry, świąd, wysypka, pęcherze, złuszczenie się naskórka, uczucie bólu lub dyskomfortu, pieczenie, kłucie, obrzęk, rumień. W przypadku nasilenia się objawów podrażnienia lub gdy objawy podrażnienia nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania leku

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu takie jak: prezerwatywy i krążki domaciczne, a tym samym zneutralizować ich skuteczność. Dlatego w czasie leczenia klotrymazolem i przez co najmniej 5 dni po jego zakończeniu, zaleca się stosować inne środki antykoncepcyjne. Należy skontaktować się z lekarzem w celu wyboru innej metody zapobiegania ciąży

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie stosować na rany i uszkodzoną skórę
- nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz zalecanym dawkowaniem i sposobem użycia

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- składniki leku Clotrimazolum mogą przenikać do mleka matki.
- jeśli kobieta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

PPF HASCO-LEK S.A., ul. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.