

# Clotrimazolum, Medana, 10mg/ml, płyn na skórę, na grzybicę, łupież pstry, 15ml



Cena: 8,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Clotrimazolum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Clotrimazolum Medana 10 mg/ml płyn na skórę 15 ml

(Clotrimazolum)

## Opis produktu:

Clotrimazolum Medana to produkt leczniczy o działaniu przeciwgrzybiczym (grzybostatycznym i grzybobójczym) skierowanym przeciw dermatofitom, drożdżakom, pleśniom. Płyn Clotrimazolum stosuje się w zakażeniach skórnych o grzybiczej etiologii, łupieżu pстрыm.

## Skład:

**Substancje czynne:** klotrymazol (Clotrimazolum).

**Substancje pomocnicze** - izopropylu mirystynian, etanol bezwodny.

1 ml płynu zawiera 10 mg klotrymazolu.

## Wskazania:

- grzybicze zakażenia skóry (spowodowane przez drożdżaki, dermatofity),
- łupież pstry,
- grzybica wałów paznokciowych.

## Działanie:

- **Clotrimazolum Medana** zawiera klotrimazol - pochodną imidazolu, która wykazuje szerokie działanie przeciwgrzybicze (w zależności od stężenia wykazuje właściwości grzybobójcze lub grzybostatyczne).

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Clotrimazolum Medana** stosuje się miejscowo na skórę, lek jest w postaci płynu.

**Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** kilka kropli płynu lekko wciera się 2 do 3 razy na dobę w chorobowo zmienione miejsca na skórze.

- Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 4 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości.
- W grzybicy stóp lek należy stosować jeszcze przez dwa tygodnie po ustąpieniu wszystkich objawów choroby, aby zapobiec jej nawrotowi.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować **Clotrimazolum Medana**:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną - klotrimazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu leczniczego,
- w pierwszym trymestrze ciąży,
- w obrębie oczu,
- doustnie,
- pod opatrunkiem okluzyjnym (nieprzepuszczającym powietrza).

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 na 10 000 osób):

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- złuszczenie naskórka, pękanie naskórka, wysypka, obrzęk, pokrzywka,
- rumień uogólniony.
- pieczenie, świąd, kłucie, przemijające podrażnienie w miejscu stosowania leku,
- reakcje uczuleniowe, w tym miejscowy odczyn uczuleniowy.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Podczas stosowania płynu należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi, oczami.
- Zmianom grzybiczym może towarzyszyć swędzenie - miejsc tych nie należy drapać ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się grzybicy.
- Należy unikać okryć, ubrać czy obuwia ograniczającego przepuszczanie ciepła i/lub wilgoci.
- Stosowanie opatrunku okluzyjnego jest przeciwwskazane.
- Zmiany chorobowe po oczyszczeniu, umyciu należy dokładnie osuszyć.
- Odzież, która styka się ze zmianami grzybiczymi, zaleca się prać w temperaturze 90°C.

## Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Stosowanie leku w pierwszym trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- O stosowaniu produktu leczniczego u dzieci do lat 11 decyduje lekarz.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Clotrimazolum Medana** może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwgrzybiczymi stosowanymi miejscowo (np. antybiotykami polienowymi - natamycyna, nystatyna),
- amfoterycyną B (osłabienie jej działania),
- miejscowymi kortykosteroidami (osłabienie działania klotrimazolu).

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Nie przechowywać w lodówce

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S. A. , Pelplińska 19, Starogard Gdański.

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.