

Contractubex, żel na blizny, 20g



Cena: 37,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Merz
Substancja czynna	Allantoinum, Allium cepa, Heparinum czynna
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Contractubex, żel - 20 g

(Allantoinum, Allium cepa, Heparinum)

Skład:

Substancjami czynnymi są: heparyna, wyciąg płynny z cebuli, alantoina.

1 g żelu zawiera 50 j.m. heparyny sodowej, 100 mg wyciągu płynnego z cebuli, 10 mg alantoiny.

Substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania miejscowego na skórę, przez kilka tygodni do kilku miesięcy.
- W przypadku leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych - niskie temperatury, promieniowanie UV, podrażnień mechanicznych.
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowane **dawkowanie Contractubex** dla dorosłych to kilkukrotne w ciągu dnia, delikatne wcieranie żelu w skórę lub tkankę blizny.
- W przypadku blizn zadawnionych i stwardniałych należy nałożyć opatrunek z żelem na noc.

Wskazania:

Contractubex stosuje się :

- w bliznach ograniczających ruch, bliznach przerostowych, obrzmiałych, o kształcie bliznowca.

Wskazaniami do zastosowania żelu są również:

- nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po amputacjach, blizny oparzeniowe i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Działanie:

- Contractubex posiada kilka składników aktywnych i działa wielokierunkowo - wykazuje efekt przeciwzapalny, wygładzający i rozluźniający tkankę blizny oraz antyproliferacyjne.
- Zawarty w żelu wyciąg z cebuli stymuluje gojenie się rany i przeciwdziała нефizjologicznemu tworzeniu się blizny. Natomiast heparyna rozluźnia strukturę kolagenu, a w leczeniu blizn działa przeciwzapalnie.
- Za przyspieszenie odnowy naskórka i zwiększenie zdolności wiązania wody przez tkankę odpowiada alantoina. Posiada ona również właściwości keratolityczne i zwiększa przenikanie pozostałych substancji czynnych.
- Synergistyczne działanie składników czynnych, czyli wzajemne wzmocnienie ich działania, powoduje dodatkowe hamowanie proliferacji fibroblastów, a szczególnie patologicznego zwiększenia syntezy kolagenu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować Contractubex w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Przeciwwskazaniami do zastosowania żelu są: niewyleczone rany, blizny obejmujące duże obszary skóry, uszkodzona skóra, aplikacja na błony śluzowe.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): swędzenie, silne zaczerwienienie, rozszerzenie naczyń włosowatych, pogłębienie blizny.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): ścieńczenie skóry, przebarwienie skóry.

Częstość nieznaną: wysypka, wysypka krostkowa, nadwrażliwość (reakcja alergiczna), parestezje, obrzęk, ból w miejscu podania, pokrzywka, podrażnienie skóry, zapalenie skóry, pieczenie skóry, złuszczenie w miejscu podania, uczucie ściągnięcia skóry.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które zamierza stosować

- Brak danych dotyczących interakcji. Dotychczas nie odnotowano interakcji leki z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

1. Podczas stosowania leku **Contractubex** obserwowano występowanie świądu, który jest wynikiem zmian bliznowatych i nie wymaga przerwania leczenia.
2. Leczenie należy rozpocząć po całkowitym wyleczeniu rany, jak najwcześniej po pojawieniu się blizny.
3. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości, stosowanie leku należy przerwać.
4. Stosowanie leku na dużą powierzchnię ciała może wiązać się z ogólnoustrojowym działaniem heparyny.
5. Contractubex zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz kwas sorbinowy, mogący wywoływać miejscowe reakcje skórne np. kontaktowe zapalenie skóry.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Brak danych dotyczących stosowania u dzieci

Przechowywanie:

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- **Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.**
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia oraz nie stosować w pobliżu otwartego płomienia i zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarek do włosów)

Podmiot odpowiedzialny:

MERZ, Frankfurt, Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym