

Controloc Control, 20mg, Pantoprazol, zgaga, 14tabletek powlekanych @



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Takeda
Substancja czynna	Pantoprazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Controloc Control, 20 mg - 14 tabletek dojelitowych

(Pantoprazolum)

Opis produktu:

Controloc Control - produkt leczniczy stosowany w zmniejszeniu ilości kwasu w żołądku. Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Skład:

Substancją czynną leku jest pantoprazol w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego.

Substancje pomocnicze: rdzeń:sodu węglan bezwodny, mannitol (E421), krospowidon, powidon K90, wapnia stearynian; otoczka: hypromeloza, powidon K25, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu laurylosiarczan, polisorbát 80, trietylu cytrynian; tusz: szelak, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172), amonowy wodorotlenek stężony.

1 tabletkę zawiera 20 mg pantoprazolu.

Wskazania:

- **Controloc Control** stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku u dorosłych.

Działanie:

- Pantoprazol blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zalecana dawka to 1 tabletkę na dobę.

- Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
- Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 dni kolejne dni.
- Należy zakończyć stosowanie leku **Controloc Control** po całkowitym usąpieniu objawów.
- Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Przeciwwskazania:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Jeśli pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV, (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 osób):

- łagodne polipy żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 na 100 osób):

- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów,
- zaparcia,

- suchość w jamie ustnej,
- ból i dyskomfort w obrębie brzucha,
- wysypka skórna lub pokrzywka,
- swędzenie skóry.

Rzadko występujące działania niepożądane (1 na 1000 osób):

- zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku,
- zaburzenia wzroku,
- bóle stawów,
- bóle mięśni,
- zmiany masy ciała.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (1 na 10000 osób):

- zaburzenia orientacji.

Częstość nieznana:

- omamy,
- splątanie,
- zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Dzieci i młodzież:

- Nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Erdomed muko może wchodzić w interakcje z lekami przeciwkaszlowymi, osłabiając odruch kaszlu mogą one utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Gmbh, Prosta 68, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.