

# Cyclo 3 Fort 150mg, żylaki, krążenie, 30 kapsułek Inpharm



Cena: 27,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Ruscus aculeatus, Hesperidinum, Acidum ascorbicum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Cyclo 3 Fort, 30 kapsułek

## Import InPharm

(150 mg suchy wyciąg z ruszczyka + 150 mg hesperydyny metylochalkon + 150 mg kwas askorbowy)

## Opis produktu:

Cyclo 3 Fort to produkt leczniczy, który wpływa na elastyczność naczyń żylnych, o działaniu ochraniającym naczynia krwionośne, do stosowania w niewydolności żylniej (uczucie ciężkich nóg) i pomocniczo w hemoroidach

## Skład:

- **Substancja czynna** - suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus* L., rhizoma), hesperydyna, kwas askorbowy (witamina C)
- **Substancje pomocnicze** - krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000; otoczka kapsułki: denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna; wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

1 kapsułka twarda zawiera 150 mg suchego wyciągu z kłącza ruszczyka kolczastego (5 - 7,5 :1), ekstrahent: etanol 85% (v/v); 150 mg hesperydyny metylochalkonu; 100 mg kwasu askorbowego (witaminy C)

## Wskazania:

- niewydolność naczyń żylnych i limfatycznych (uczucie ciężkości nóg)
- dolegliwości bólowe związane z żylakami odbytu

## Działanie:

- ochronne i tonizujące na naczynia krwionośne
- poprawia napięcie ścian naczyń żylnych i zmniejszające przepuszczalność naczyń włosowatych

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### Leczenie objawowe niewydolności naczyń żylnych:

- 2-3 kapsułki dziennie w schemacie 1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem lub 2 kapsułki rano i 1 kapsułka wieczorem

### Leczenie pomocnicze w żylakach odbytu:

- 4-5 kapsułek dziennie w schemacie 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem lub 3 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem
- lek do stosowania doustnego
- kapsułki należy stosować ze szklanką wody
- lek przeznaczony jest dla osób dorosłych

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie stosować w przypadku, gdy pacjent ma zaburzenia gospodarki żelazowej ze względu na obecność w składzie kwasu askorbowego (witaminy C)

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

### Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- biegunka
- ból brzucha

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):**

- bezsenność
- niestrawność, mdłości
- rumień, świąd
- skurcze mięśni, bóle kończyn (rąk / nóg)

**Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):**

- zawroty głowy
- uczucie zimna w kończynach
- ból naczyń żylnych (wrażliwość naczyń żylnych)
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe
- wzrost aktywności enzymu wątrobowego (aminotransferazy alaninowej)

**Częstość nieznaną:**

- ból żołądka
- pokrzywka

**Ciąża i karmienie piersią:**

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem
- lek nie powinien być przyjmowany podczas karmienia piersią

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

- Cyclo 3 Fort przeznaczony jest dla osób dorosłych

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- Jeśli podczas stosowania pojawi się stan zapalny skóry, owrzodzenia skórne - należy skontaktować się z lekarzem
- Jeśli wystąpi obrzęk 1 lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca / nerek należy skontaktować się z lekarzem
- Jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem
- W przypadku stosowania leku w zaburzeniach krążenia żylnego - jeśli po 2 tygodniach pojawił się dyskomfort lub kruchość naczyń, należy skontaktować się z lekarzem
- Lek zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110), która może powodować reakcje alergiczne

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią

## Podmiot odpowiedzialny w Grecji, kraju eksportu:

Pierre Fabre Farmaka A.E., 350, Mesogeion Ave., 15341 Agia Paraskevi, Attyka, Grecja.

## Importer równoległy:

InPharm Sp. Z o.o. , Strumykowa 28/11/ Warszawa.

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.