

DAKTARIN KREM 2% X 15 G



Cena: 33,92 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.

Substancja
czynna Miconazolum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Daktarin 20 mg/g, krem - 15 g

(Miconazolum)

Opis produktu:

Krem Daktarin to lek przeciwgrzybiczy. Produkt leczniczy zawiera mikonazol, działający m. in. na dermatofity, drożdżaki oraz pałeczki i ziarenkowce bakterii Gram-dodatnich. Krem **stosuje się w przypadku grzybic skóry głowy, tułowia, rąk czy pachwin oraz w stopie sportowca**. Daktarin można również stosować w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie, jako np. krem na pieluszkowe zapalenie skóry.

Skład:

- **Substancje czynne:** mikonazol (Miconazoli nitras).
- **Substancje pomocnicze** - butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210), parafina ciekła, makrogoliglicerydów oleiniany, makrogolo 6 i makrogolo 32 glikolu stearynian, woda oczyszczona

1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu.

Wskazania:

- grzybicze zakażenia skóry wywołane dermatofitami, drożdżakami, innymi grzybami (grzybica głowy, tułowia, rąk; grzybica

pachwin; grzybica międzypalcowa stóp - stopa sportowca),

- grzybice wtórnie zakażone przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry).

Działanie:

- **Daktarin** zawiera mikonazol o działaniu przeciwgrzybiczym, który wykazuje swoją aktywność przeciw dermatofitom, drożdżakom.
- Wykazuje również działanie przeciwbakteryjne na bakterie Gram-dodatnie (pałeczki i ziarenkowce).
- Łagodzi świąd skóry, który towarzyszy zakażeniom dermatofitami i drożdżakami.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się 2 razy na dobę, na miejsce zmienione chorobowo.

- Lek stosuje się miejscowo na skórę.
- Czas leczenia wynosi zwykle 2-6 tygodni (w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian).
- Po ustąpieniu objawów, lek stosuje się przez okres co najmniej 1 tygodnia.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować Daktarin:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników tego leku,
- w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, błon śluzowych, paznokci,
- na zranioną skórę.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości,
- kontaktowe zapalenie skóry,
- wysypka, rumień, świąd,
- uczucie palenia na skórze,
- podrażnienie w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku Daktrin, krem należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Podczas stosowania kremu należy unikać kontaktu z oczami.
- Jeśli wystąpią objawy uczulenia lub podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku.

Daktarin zawiera 2mg kwasu benzoesowego w każdym g kremu. Kwas benzoesowy może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówki oczu) u noworodków (do 4 tygodnia życia)

Daktarin zawiera butylohydroksyanizol. Lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Daktarin może wchodzić w interakcje z:

- warfaryną,
- fenytoiną,
- doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght

Dublin 24, Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.