


Debutir czopki doodbytnicze x 10 czopków

Cena: 29,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Debutir czopki - 10 czopków doodbytniczych

(maślan sodu)

Wyrób medyczny Debutir to czopki doodbytnicze z maślanem sodu przeznaczone do stosowania jako wsparcie w odtwarzaniu naturalnego stanu fizjologicznego śluzówki odbytnicy

Składniki:

1 czopek doodbytniczy Debutir o masie 2 g zawiera:

- maślan sodu, alginian sodu, karboksymetylocelulozę, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych z dodatkiem mono- i diglicerydów

Właściwości składników:

- wsparcie w procesie odtwarzania naturalnego stanu fizjologicznego błony śluzowej odbytnicy, a także do pomocniczego stosowania w regeneracji nadżerek, pęknięć oraz innych ubytków w obrębie śluzówki odbytnicy.

- preparat działa łagodząco na objawy związane z bolesnym wypróżnianiem (po uszkodzeniu nabłonka lub w przebiegu procesu zapalnego w odbytnicy) i wspomaga regenerację tkanek odbytu po radioterapii i po zabiegach chirurgicznych
- czopek po aplikacji powleka powierzchnię błony śluzowej odbytnicy warstwą o dobrych właściwościach przylegających i wysokiej barierowości
- nawilża i chroni śluzówkę odbytnicy, zapewnia także środowisko sprzyjające odtwarzaniu jej naturalnego stanu fizjologicznego.
- ważną cechą czopka jest jego zdolność do szybkiego pęcznienia oraz zachowania swojej struktury po zwilżeniu, wytwarzana w odbytnicy powłoka jest lepka, plastyczna i ma dobrą barierowość

Stosowanie wyrobu:

Jeden czopek na dobę.

Czopki można stosować przez 5 dni. Stosowanie wyrobu może być kontynuowane do 10 dni w porozumieniu z lekarzem.

Sposób użycia:

- **stosować doodbytniczo**
- przed użyciem zaleca się zapoznać z ulotką
- czopek wyjąć z blistra bezpośrednio przed użyciem
- należy dokładnie umyć i osuszyć ręce przed aplikacją czopka
- umieścić czopek ostrożnie w kanale odbytu
- po zastosowaniu dokładnie umyć ręce
- zaleca się stosować jeden czopek raz na dobę, aplikować na noc
- odstęp między pierwszą i kolejną aplikacją nie może być krótszy niż 24 godziny
- czas stosowania: można stosować przez 5 dni, stosowanie można kontynuować do 10 dni po konsultacji z lekarzem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie stosować, jeśli opakowanie było naruszone lub uszkodzone.
- nie spożywać
- nie stosować dopochwowo
- możliwość stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią tylko na wyraźne zlecenie lekarza
- bez konsultacji z lekarzem nie stosować równocześnie z innymi preparatami doodbytniczymi
- nie stosować w przypadku silnego, ostrego bólu okolicy odbytu
- nie stosować w przypadku zmian nowotworowych odbytnicy
- nie stosować w przypadku krwawienia z odbytnicy samoistnego lub przy wypróżnieniu (występowanie jasnoczerwonej krwi na

stolcu)

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- chronić przed wilgocią

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2274
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.