

Debutir Forte, 60 kapsułek



Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polpharma

Substancja
czynna -

Typ produktu

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Debutir Forte , 60 kapsułek

Składniki:

Maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, środek zmętniający kapsułkę (barwnik węglan wapnia; tlenek cynku, skrobia, maltodekstryna, stabilizator guma arabska), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancje zelujące: karagen, chlorek potasu.

Informacja o wartości odżywczej i składnikach produktu w 100g :

- Wartość energetyczna 2036kJ/496 kcal
- Tłuszcz 48,03g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 47,73 g
- Węglowodany 4,89 g w tym cukry 0 g
- Błonnik 21,97g
- Białko 0 g
- Sól 24,44g z czego sód 9,82
- Maślan sodu 37,970 g w tym kwas masłowy 30,380 g

Informacja o wartości odżywczej i składnikach produktu w 1 kapsułce:

- Wartość energetyczna 14,66kJ/3,57kcal
- Tłuszcz 48,03g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,34g
- Węglowodany 0,04 g w tym cukry 0 g
- Błonnik 0,16 g
- Białko 0 g
- Sól 0,18 g z czego sól 0,07
- Maślan sodu 300 mg w tym kwas masłowy 240 mg

Informacja o wartości odżywczej i składnikach produktu w 2 kapsułkach

- Wartość energetyczna 293,32 kJ/ 7,14kcal
- Tłuszcz 0,7g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,68g
- Węglowodany 0,08 g w tym cukry 0 g
- Błonnik 0,32 g
- Białko 0 g
- Sól 0,36 g z czego sól 0,14
- Maślan sodu 600 mg w tym kwas masłowy 480 mg

Do postępowania dietetycznego w:

- Chorobach czynnościowych jelit w tym zespole jelita nadwrażliwego, zaparcie, wzdęcie
- Ostre biegunki różnego pochodzenia
- choroba uchyłkowa
- Nieswoiste choroby zapalne jelit
- Zaburzenia składu mikrobioty jelitowej m.in. w trakcie i po antybiotykoterapii

Sposób użycia:

Dorośli:

- doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy

Dzieci powyżej 7. roku życia:

- doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować

w trakcie posiłku.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia preparatu.

Środki ostrożności i przeciwwskazania:

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego
- Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność
- Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego stosowania

Ważna informacja:

- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza
- Jest żywnością niekompetentną pod względem odżywczym
- **Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia**
- Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie
- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Chronić przed wilgocią

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański