


Debutir x 60 kapsułek



Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	

Opis produktu

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Debutir, 60 kapsułek

(maślan sodu 150 mg)

Debutir jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, zawierających maślan sodu w mieszanicy acylogliceroli (mono-, di- i tracyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Dzięki innowacyjnej formule otoczki, maślan sodu dociera do jelita grubego.

Składniki:

Maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, środek zmętniający kapsułkę (barwnik węglan wapnia; tlenek cynku, skrobia, maltodekstryna, stabilizator guma arabska), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancje zelujące: karagen, chlorek potasu.

Informacja o wartości odżywczej i składnikach produktu w 100g :

- Wartość energetyczna 2017kJ/491 kcal
- Tłuszcz 43,35g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 43,06 g
- Węglowodany 6,67 g w tym cukry 0 g
- Błonnik 19,82g
- Białko 0 g

- Sól 22,17g z czego sól 8,90
- Maślan sodu 37,970 g w tym kwas masłowy 30,380 g

Informacja o wartości odżywczej i składnikach produktu w 1 kapsułce:

- Wartość energetyczna 7,87kJ/1,91kcal
- Tłuszcz 0,17g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,17g
- Węglowodany 0,03 g w tym cukry 0 g
- Błonnik 0,08 g
- Białko 0 g
- Sól 0,10 g z czego sól 0,04
- Maślan sodu 150 mg w tym kwas masłowy 120 mg

Informacja o wartości odżywczej i składnikach produktu w 2 kapsułkach

- Wartość energetyczna 15,74 kJ/ 3,82 kcal
- Tłuszcz 0,34 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,34g
- Węglowodany 0,06 g w tym cukry 0 g
- Błonnik 0,16 g
- Białko 0 g
- Sól 0,20 g z czego sól 0,08
- Maślan sodu 300 mg w tym kwas masłowy 240mg g

Do postępowania dietetycznego w:

- Zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki.
- Zespole jelita nadwrażliwego (IBS)
- Zaburzeniach flory bakteryjnej m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii,
- Niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)
- Chorobach jelita grubego przebiegających ze zmianami zanikowymi w obrębie błony śluzowej.

Sposób użycia:**Dorośli:**

- doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy

Dzieci powyżej 7. roku życia:

- doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia preparatu.

Środki ostrożności i przeciwwskazania:

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego
- Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność
- Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir należy zaprzestać jego stosowania

Ważna informacja:

- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza
- Jest żywnością niekompetentną pod względem odżywczym
- **Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia**
- Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie
- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Chronić przed wilgocią

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański