

## Deflegmin krople doustne 7,5 mg/ml 50 ml



Cena: 20,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Substancja czynna	Ambroxolum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

## Deflegmin baby, 7,5 mg/ml, krople doustne, roztwór, 50 ml (Ambroxoli hydrochloridum)

Lek w postaci kropli doustnych ułatwiający odkrztuszanie i łagodzący kaszel.

### Wskazania:

- Ostre przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnionym odkrztuszaniem lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

### Działanie:

- zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

## Skład:

### Substancja czynna:

- ambroksolu chlorowodorek

1 ml roztworu (25 kropli) zawiera 7,5 mg ambroksolu chlorowodoru

### Substancje pomocnicze:

- kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin Baby w postaci kropli doustnych:

- u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

początkowo, przez 2 do 3 dni, 4 ml (100 kropli) 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 4 ml 2 razy na dobę.

- u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

2 ml (50 kropli) 2 do 3 razy na dobę.

- u dzieci w wieku od 2 do 6 lat:

1 ml (25 kropli) 3 razy na dobę

- u dzieci w wieku od 1 do 2 lat:

1 ml (25 kropli) 2 razy na dobę

Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Deflegmin Baby w postaci kropli doustnych należy przyjmować doustnie, po posiłkach, rozcieńczony herbatą, sokiem owocowym, mlekiem lub wodą.

Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

- jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpi jedno z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Deflegmin Baby i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

- reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i świąd
- ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Częstość występowania wyżej wymienionych działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

**Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):**

- nudności,
- osłabienie czucia w jamie ustnej i gardle,
- zaburzenia smaku (np. zmieniony smak).

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):**

- wymioty, biegunka, niestrawność i ból brzucha,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej.

**Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):**

- reakcje nadwrażliwości,
- wysypka, pokrzywka,
- zgaga, zaparcia.

**Działania niepożądane o częstości nieznaney (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):**

- świąd, inne reakcje alergiczne niewymienione powyżej,
- suchość w gardle

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

**Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie zaleca się stosowania leku Deflegmin Baby w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży.
- Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku Deflegmin Baby w okresie karmienia piersią.

- Wpływ stosowania leku na płodność ludzi nie był badany.
- Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu ambroksolu na płodność

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:**

- Nie ma dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
- Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Deflegmin Baby na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

#### **Deflegmin baby zawiera chlorek bezalkoniowy:**

- Lek zawiera 0,25 mg chlorku bezalkoniowego w każdym 1 ml roztworu (25 kropli), co odpowiada 1 mg chlorku bezalkoniowego / 4 ml roztworu (100) kropli. Chlorek bezalkoniowy może powodować miejscowe podrażnienie.

#### **Deflegmin baby zawiera sól:**

- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23mg) sodu w 1 ml roztworu (25 kropli) to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu.

## **Interakcje z innymi lekami:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Ambroksol powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków (amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna, doksycyklina) w miąższu płucnym.
- Leki przeciwkaszlowe (np. kodeina) hamują odruch kaszlowy i utrudniają odkrztuszanie upłynionego śluzu, dlatego nie należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi.
- Nie wykazano istotnego oddziaływania ambroksolu z innymi lekami.

## **Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Chronić od światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

## **Podmiot odpowiedzialny:**

Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive Dublin 24, D24PPT3 Irlandia

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.