

## Dentinox N żel 10g DELFARMA



Cena: 21,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	DELFARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Lidocainum, Matricaria chamomilla, Lauromacrogolum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Dentinox N żel na zębokowanie - 10 g

(Chamomillae tinctura + Lidocaini hydrochloridum monohydricum + Lauromacrogolum 400)

Import równoległy - Delfarma Sp. z o.o.

Kraj eksportu: Bułgaria

### Opis produktu:

Dentinox N to produkt leczniczy do stosowania w podrażnieniu dziąseł i dolegliwościach bólowych związanych z zębokowaniem, wyrzynaniem się zębów mlecznych

### Skład:

Substancją czynną jest:

- nalewka z rumianku (Chamomillae tinctura)

- **lidokaina** (Lidocaini hydrochloridum)
- **makrogol** (Macrogoli aether laurilicum)

#### substancje pomocnicze:

- karbomer (934 P), lewomentol, sodu wodorotlenek, polisorbat 20, glikol propylenowy, sól sodowa sacharyny, sorbitol ciekły niekryształizujący, woda oczyszczona, ksylitol

10 g żelu zawiera 1500 mg nalewki z rumianku (1:4-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v), 34 mg chlorowodorku lidokainy, 32 mg makrogolu eter laurylowy

## Wskazania:

- ząbkowanie niemowląt
- stany zapalne dziąseł
- może być również stosowany podczas wyrzynania się zębów mądrości

## Działanie:

- łagodzi objawy związane z ząbkowaniem
- łagodzi podrażnienie dziąseł i dolegliwości bólowe

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- lek stosować 2-3 razy dziennie
- niewielką ilość żelu (wielkość ziarnka grochu) wmasować w dziąsła - palcem lub patyczkiem bawełnianym
- żel aplikować szczególnie po jedzeniu lub po zabiegach higienicznych w jamie ustnej przed pójściem spać
- lek do stosowania na dziąsła
- lek do stosowania krótkotrwałego w ostrych objawach ząbkowania

Żel na dziąsła **Dentinox N** może być stosowany przez cały okres wyrzynania się zębów mlecznych. To samo dotyczy wyrzynania się zębów trzonowych

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- w przypadku nietolerancji rumianku lub innych roślin z rodziny Asteraceae (w tym reakcji krzyżowej), reakcji nadwrażliwości na rumianek (np. kontaktowe zapalenie skóry)

- w przypadku nietolerancji lidokainy lub podobnych środków miejscowo znieczulających (typu amidowego)
- w przypadku nietolerancji fruktozy

## Działania niepożądane:

Jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią

### Częstość nieznaną:

- reakcje nadwrażliwości błon śluzowych i skóry - objawy pieczenia, zaczerwienienia
- w przypadku wystąpienia nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- nie stosować z innymi środkami miejscowo znieczulającymi

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami
- w przypadku pojawienia się silniejszego zaczerwienienia, obrzęku, reakcji nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem
- lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować miejscowe podrażnienie
- lek zawiera sorbitol, który nie powinien być stosowany w nietolerancji fruktozy
- lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 3 miesiąca życia
- **Dentinox N** nie powinien być stosowany u niemowląt poniżej 12 miesiąca życia, jednocześnie leczonych środkami wywołującymi methemoglobinemię

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Miralex Sp. z o.o. ul. Św. Szczepana 25 61-465 Poznań

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym