

Dentosept A płyn 25 g afty stany zapalne jamy ustnej



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm Klęka S.A.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Dentosept A - 25 g płyn afty, stany zapalne jamy ustnej i dziąseł

Opis produktu:

Dentosept A to produkt leczniczy stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł

Skład:

Substancje czynne:

wyciąg płynny złożony z: koszyczka rumianku (*Matricariae recutita* L.), kory dębu (*Quercus* spp.), liścia szatwi (*Salviae officinalis* L.), ziela arnika (*Arnica* spp.), kłącza tataraku (*Acorus calamus* L.), ziela mięty pieprzowej (*Menthae piperitae herba*), ziela tymianku (*Thymus* spp.); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) 50g Benzocainum - 2g.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol. Produkt zawiera 35-45% (V/V) etanolu (alkohol)

Wskazania:

Lek stosowany tradycyjnie w:

- stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł,
- aftach,
- odleżynach jamy ustnej (po protezach zębowych),
- pomocniczo w paradontozie
-

Działanie:

- **Dentosept A** działa w szerokim zakresie objawów: przeciwzapalnie, odkażająco, przeciwbakteryjnie, ściągająco i znieczulająco.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** smarować miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej za pomocą patyczka higienicznego do 3 razy na dobę.
- Bezpośrednio po zastosowaniu leku nie płukać jamy ustnej.
- Produkt stosować przez 7 dni, w przypadku, gdy objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek może być stosowany do ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Dentosept A**

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną oraz arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae).
- u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Bezpośrednio po zastosowaniu leku alkohol może być wykrywany przez urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przemijająco mogą wystąpić : przebarwienia zębów i śluzówki jamy ustnej, krótkotrwałe pieczenie błony śluzowej.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.