

Dentosept płyn 100ml koncentrat



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm Klęka S.A.
Substancja czynna	Herbal praeparatio
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Dentosept 4,55 g/ 5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do stosowania w jamie ustnej 100 ml

Opis produktu:

Dentosept to produkt leczniczy stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł.

Kiedy używać produktu Dentosept?

- w przypadku zapalenia dziąseł i przyzębia,
- jako środek ściągający, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny.

Dentosept zaleca się używać także w przypadku dziąseł ze skłonnością do krwawień oraz pomocniczo w przypadku paradontozy.

Wskazania:

- zapalenie dziąseł i jamy ustnej (w tym zapalenie języka), powierzchowne zapalenie przyzębia, jako środek ściągający, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny,
- w skłonnościach do krwawień z dziąseł i pomocniczo w parodontozie jako środek ściągający.

Skład:

Wyciąg płynny złożony z: koszyczka rumianku (*Matricariae flos*), kory dębu (*Quercus cortex*), liścia szałwi (*Salviae folium*), ziela arnika (*Arnica herba*), kłącza tataraku (*Calami rhizomate*), ziela mięty pieprzowej (*Menthae piperitae herba*), ziela tymianku (*Thymi herba*); benzokaina.

100 g produktu zawiera:

wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (*Matricariae flos*), kory dębu (*Quercus cortex*), liścia szałwi (*Salviae folium*), ziela arnika (*Arnica herba*), kłącza tataraku (*Calami rhizomate*), ziela mięty pieprzowej (*Menthae piperitae herba*), ziela tymianku (*Thymi herba*) (2/2/2/1/1/1/1) i 2 g benzokainy. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

Działanie:

Przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, odkażające.

Dawkowanie:

- **Dorośli:** odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski na miarce) i uzupełnić wodą (do wyższej kreski na miarce). Tak przygotowanym roztworem płukać jamę ustną lub gardło.
- **Dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzież:** po konsultacji z lekarzem, odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski na miarce) i przelać do szklanki wody (ok. 250 ml). Tak przygotowanym roztworem płukać jamę ustną lub gardło.
- **Dzieci w wieku poniżej 6 lat:** nie stosować.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, ciąża, laktacja.
- Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
- Dawka jednorazowa leku (10 ml) zawiera do 5,67 g etanolu.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Bezpośrednio po zastosowaniu leku alkohol może być wykrywany przez urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.