

Dernilan maść, zrogowacenia, pęknięcia skóry 35g



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Dernilan maść - 35 g

Opis produktu:

Dernilan to produkt leczniczy stosowany do pielęgnacji skóry stóp i rąk w przypadku bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka

Składniki:

- **Substancja czynna** - kamfora racemiczna, alantoina, nikotynamid, kwas salicylowy
- **Substancje pomocnicze** - wazelina biała, glicerol, woda oczyszczona, alkohol cetylowy, cholesterol, matylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan

100 g kremu zawiera 1 g kamfory racemicznej, 300 mg alantoiny, 250 mg nikotynamidu i 100 mg kwasu salicylowego

Wskazania:

Dernilan jest przeznaczony do stosowania w przypadku bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk

Działanie:

- **Dernilan** działa gojąco i przeciwzapalnie, przyspiesza ziarninowanie oraz ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

- skórę stóp i rąk smarować maścią od 3 do 4 razy na dobę
- maść lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek
- po wygojeniu zmian stosować 1-2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Dernilan:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancje pomocniczą
- na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe
- u dzieci poniżej 12 lat
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- alergiczne reakcje skórne
- miejscowe podrażnienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan i dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego)
- ze względu na zawartość alkoholu stearylowego może powodować miejscową reakcję skórą np. kontaktowe zapalenie skóry

Ciąża i karmienie piersią:

- nie stosować leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Herbapol Wrocław Świętego Mikołaja 65/68 Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.