

## Desmoxan, 1,5 mg, rzucanie palenia, 100 tabletek



Cena: 49,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Cytisinum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

## Desmoxan 1,5 mg - 100 tabletek powlekanych (Cytisinum)

### Opis produktu:

Leczy uzależnienie od nikotyny

- Zmniejsza objawy głodu nikotynowego, po zaprzestaniu palenia.

### Skład:

- substancją czynną jest - cytyzyna
- substancje pomocnicze - mannitol, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, glicerolu dibehenian, hypromeloza.

1 tabletkę powlekaną zawiera 1,5 mg cytyzyny.

### Wskazania:

- Lek Desmoxan to tabletki powlekane ułatwiające odzwyczajenie się od palenia tytoniu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego u osób z zamiarem rzucenia palenia.

- Lek umożliwi stopniowe likwidowanie uzależnienia organizmu od nikotyny, łagodząc objawy odstawienia, aby w konsekwencji palacz mógł trwale zaprzestać stosowania produktów nikotynowych

## Działanie:

- Cytyzyna zawarta w preparacie Desmoxan działa podobnie do nikotyny. Ze względu na to podobieństwo, po wchłonięciu do organizmu, zachowuje się jak "substytut" nikotyny. Łączy się z tymi samymi receptorami, blokując dostęp nikotynie. Dzięki temu zmniejsza objawy głodu nikotynowego i zależność od nikotyny.
- Łagodzi objawy związane z odstawieniem nikotyny.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Desmoxan należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody zgodnie z poniższym schematem:**

- od 1. do 3. dnia: 1 tabletkę co 2 godziny (6 tabletek dziennie),
- od 4. do 12. dnia: 1 tabletkę co 2,5 godziny (5 tabletek dziennie),
- od 13. do 16. dnia: 1 tabletkę co 3 godziny (4 tabletki dziennie),
- od 17. do 20. dnia: 1 tabletkę co 5 godzin (3 tabletki dziennie),
- od 21. do 25. dnia: 1-2 tabletki na dobę (do 2 tabletek dziennie).
- **Od pierwszego dnia leczenia należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.**
- **Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.**
- **Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.**
- **Jeśli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie. Leczenie można rozpocząć ponownie po upływie 2 do 3 miesięcy**

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej
- w przypadku przebytego niedawno zawału serca lub udaru mózgu
- w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca
- okres ciąży i laktacji
- nie zaleca się jego stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek ze względu na brak doświadczenia

klinicznego z produktem leczniczym Desmoxan u pacjentów w tej grupie

- ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Desmoxan u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
- nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Desmoxan u osób w wieku poniżej 18 lat. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Desmoxan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Działania niepożądane najczęściej występują na początku leczenia. Większość działań niepożądanych zanika w trakcie leczenia. Są to:**

- męczliwość, złe samopoczucie, zmęczenie
- łzawienie
- zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała
- bóle, zawroty głowy, rozdrażnienie, uczucie ciężkości głowy
- zaburzenia snu (bezsennność, senność, dziwne sny, koszmary ospałość)
- zmiany nastroju, lęk, trudności w koncentracji
- osłabienie popędu płciowego
- przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca
- wzrost ciśnienia tętniczego
- duszność, wzmożone odkrztuszanie
- suchość w jamie ustnej, nadmierne ślinienie
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (ból brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, wzdęcia
- zgaga
- pieczenie języka, zmiany smaku
- bóle mięśniowe
- wysypka, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry
- zwiększenie aktywności aminotransferaz (pewien rodzaj enzymów wątrobowych).

### W przypadku występowania następujących chorób:

- choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, schorzenia naczyń mózgowych, zaburzenia drożności tętnic, nadciśnienie tętnicze
- guz chromochłonny nadnerczy
- chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku

- nadczynność tarczycy
- cukrzyca
- niektóre postaci schizofrenii
- niewydolność nerek i wątroby - jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Desmoxan może wchodzić w interakcje z:**

- teofiliną
- takryną
- klozapiną
- ropinirolem
- jednoczesne stosowanie Desmoxanu z lekami przeciwgruźliczymi (PASA, streptomycyna) zmniejsza działanie pobudzające leku.

W przypadku kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne zaleca się stosowanie dodatkowej metody barierowej (np. prezerwatywę).

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

**Ciąża i karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie wolno stosować tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

- Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat bez konsultacji z lekarzem

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

- Lek Desmoxan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.