

Dezaftan Med, aerozol na afty, 30ml



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Cetylpyridinium, Lidocainum, Zincum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Dezaftan Med aerozol do stosowania w jamie ustnej - 30 ml

Opis produktu:

Aerozol do stosowania w jamie ustnej Dezaftan med to lek miejscowo znieczulający i odkażający. Lek posiada w składzie 3 składniki aktywne o uzupełniającym się działaniu. Lidokaina miejscowo znieczula, łagodząc ból, a chlorek cetylopirydynowy działa antyseptycznie. Dodatkowo lek wspiera układ odpornościowy glukonianem cynku. Dezaftan med stosuje się w stanach zapalnych dziąseł, jamy ustnej oraz drobnych infekcjach śluzówki, jak np. afty czy pleśniawki. Aerozol można stosować u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład:

Substancje czynne - chlorek cetylopirydynowy, lidokaina chlorowodorek, cynku glukonian.

Substancje pomocnicze - lewomentol, etanol 96%, glicerol, sukraloza (E 955), woda oczyszczona.

1 ml aerozolu zawiera:

- 2,9 mg - cetylopirydynowego chlorku,

- 1,96 mg - lidokainy chlorowodorku
- 25,6 mg - cynku glukonianu (co odpowiada 3,7 mg jonów cynku).

Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,17 ml roztworu. 3 dawki (0,51 ml roztworu) zawierają 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku, 1,0 mg lidokainy chlorowodorku oraz 13,065 mg cynku glukonianu (co odpowiada 1,875 mg jonów cynku).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się miejscowo, spryskując śluzówkę jamy ustnej. Dezaftan med jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania, nie używać dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zalecane dawkowanie Dezaftan med zależy od wieku pacjenta. U osób dorosłych należy stosować 3 dawki aerozolu co 1 lub 2 godziny, ale nie więcej niż 8 razy na dobę. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 lat podawać 3 dawki aerozolu co 2 do 3 godzin, ale nie częściej niż 6 razy w ciągu doby. Przed użyciem dozownika, należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi przedstawioną w ulotce dołączonej do leku.

Działanie:

Dezaftan med działa wielokierunkowo.

- **Chlorek cetylopirydyniowy** - odkaża, działa bakterio- i grzybobójczo, a także przeciwwirusowo.
- **Chlorowodorek lidokainy** - miejscowo znieczula, dzięki czemu łagodzi ból.
- **Glukonian cynku** - wspiera układ odpornościowy.

Wskazania:

Dezaftan med stosuje się w:

- stanach zapalnych jamy ustnej,
- zapaleniu dziąseł,
- zakażeniach oraz owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej (afty, pleśniawki), wywołane np. przez aparaty ortodontyczne czy protezy dentystyczne.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować Dezaftanu med u osób z nadwrażliwością na chlorek cetylopirydyniowy, chlorowodorek lidokainy, glukonian cynku (substancje czynne leku), inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników.
- Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, methemoglobinemia, nużliwość mięśni.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Niezbyt często występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 osób na 1 000): miejscowe reakcje skórne, takie jak: rumień (miejscowe zaczerwienienie skóry), świąd, wyprysk, pieczenie.
- **Rzadko występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 osób na 10 000): ciężkie reakcje skórne, takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione; pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze); nadwrażliwość na światło słoneczne; ból głowy; zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka); wymioty, metaliczny smak w ustach; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
- **Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (u mniej niż 1 osoby na 10 000): nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem Dezaftanu med należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: stanu zapalnego gardła oraz kilku dniowej gorączki czy bólu gardła z gorączką, zawrotami głowy, wymiotami lub nudnościami.
- Chlorowodorek lidokainy może zaburzać odruch połykania i zwiększać prawdopodobieństwo zachłyśnięcia.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 3 miesiące.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Dezaftan med może wchodzić w interakcje z:

- kwasem acetylosalicylowym;
- sulfonamidami;
- cymetydyną;
- beta-adrenolitykami (leki stosowane w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca, np. propranolol);
- norepinefryną;
- anestetykami wziewnymi (leki stosowane do znieczulenia ogólnego);
- barbituranami (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki);
- ryfampicyną (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy oraz niektórych innych zakażeń);
- fenytoiną (lek stosowany w leczeniu padaczki);
- lekami zwiotczającymi mięśnie poprzecznie prążkowane (np. pankuronium);
- antybiotykami z grupy tetracyklin (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych);
- substancjami chelatującymi (leki stosowane w zatruciu metalami, np. D-penicylamina);
- ibuprofenem lub indometacyną (leki przeciwbólowe należące do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ);
- tiazydowymi lekami moczopędnymi (leki zwiększające wytwarzanie moczu);

- kortykosteroidami (leki stosowane m.in. w leczeniu choroby reumatycznej);
- lekami oraz suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Nie należy stosować leku podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem, ze względu na ryzyko zachłyśnięcia. Lek najlepiej stosować godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.
- Należy zachować ostrożność podczas picia gorących napojów i jedzenia gorących pokarmów. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko oparzenia błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła.
- Podczas stosowania leku Dezaftan med, nie należy spożywać produktów mlecznych, ponieważ zmniejszają one wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Lek Dezaftan med nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody antykoncepcji.
- Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie podawać dzieciom poniżej 6 lat.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu