

Diclostim roztwór do płukania gardła i jamy ustnej 150ml



Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka SOLINEA SP. Z O.O.

Substancja
czynna Diclofenacum

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Diclostim, 0,74 mg/ml, roztwór do płukania gardła/jamy ustnej, 150 ml (Diclofenacum)

Lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego.

Wskazania:

- Leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła)
- W stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego.

Działanie:

- Wykazuje działanie przeciwzapalne oraz przeciwbólowe

Skład:

Substancja czynna:

- diklofenak

Każdy ml roztworu do płukania gardła / jamy ustnej zawiera 0,74 mg diklofenaku (Diclofenacum) w postaci diklofenaku sodowego

Substancje pomocnicze:

- sorbitol (E 420); acesulfam potasowy (E 950); disodu edetynian; sodu benzoesan (E 211); choliny chlorek; sodu wodorowęglan; disodu fosforan dwuwodny; glikol propylenowy (E 1520); lewomentol; glicerol; aromat czarnej porzeczki (glikol propylenowy E 1520, składniki poprawiające smak i zapach, naturalne składniki poprawiające smak i zapach, pulegon); aromat miętowy (glikol propylenowy E 1520, trioctan glicerolu E 1518, naturalne składniki poprawiające smak i zapach); aromat cytrynowy (etanol, woda, składniki poprawiające smak i zapach, naturalne składniki poprawiające smak i zapach); czerwień koszenilowa (E 124); diwodorofosforan sodu dwuwodny; woda oczyszczona

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

- Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę.
- Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund.
- Po użyciu roztwór należy wypluć.

Stosowanie u dzieci poniżej 14 lat:

- Leku Diclostim nie należy stosować w wieku poniżej 14 lat.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci poniżej 14 lat.
- Nie należy stosować leku Diclostim jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny)

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego) mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej.
- Może dojść również do rozwoju reakcji nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.
- Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku połącznienia lub długotrwałego stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

- Jeśli pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Leku Diclostim nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

Etanol:

- Lek zawiera 0,56 mg etanolu w każdym miligramie, co jest równoważne 0,58 mg/ml.
- Ilość alkoholu w 15 ml tego leku jest równoważna mniej niż 1 ml piwa.
- Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Sorbitol:

- Lek zawiera sorbitol, 375 mg w każdej pojedynczej dawce (15ml)
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sód:

- Lek zawiera 58 mg sodu na każdą pojedynczą dawkę (15ml)

Potas:

- Lek zawiera mniej niż 3 mg potasu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za wolny od potasu.

Sodu benzoesan:

- Lek zawiera 312 mg sodu benzoesanu w każdej pojedynczej dawce(15ml), który może powodować miejscowe podrażnienie

Czerwień koszenilowa:

- Lek zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

Glikol propylenowy:

- Lek zawiera glikol propylenowy 75 mg w każdej pojedynczej dawce (15ml)

Ze względu na możliwość połknięcia pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie mogą przyjmować tego leku.

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie są znane oddziaływania tego leku z innymi lekami do stosowania miejscowego w jamie ustnej.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Chronić od światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K. Elizówka 65, Hala I 21-003 Ciecierzyn

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.