

Dicloziaja żel 0,0116 g/g 100 g @



Opis produktu

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.

Substancja
czynna Diclofenacum

Typ produktu

Dicloziaja, lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, 11,6 mg/g - 100 g

(Diclofenacum diethylammonium)

Opis produktu:

Dicloziaja to żel zawierający diklofenak dietyloamoniowy, należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wykazujących działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże żel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Składniki:

- **Substancja czynna** - diklofenak w postaci diklofenaku dietyloamoniowego.
- **Substancje pomocnicze** - karbomer 5984, dietanoloamina, makrogolu eter cetostearylowy 20, kokozylokaprylokapronian, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, kompozycja zapachowa Perfum cream 221085 PO, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego.

Wskazania:

Młodzież powyżej 14 lat – leczenie krótkotrwałe:

- miejscowe leczenie objawowe bólu w nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami

Dorośli:

- pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałe wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłucze
- bóle pleców
- ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty
- ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

Działanie:

- **Przeciwbólowe i przeciwzapalnie.**
- Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże żel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat - 3 lub 4 razy na dobę należy delikatnie wcierać żel w chorobowo zmienione miejsce.

- Ilość użytego leku należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo.
- 2 g do 4 g (ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest wystarczająca do posmarowania powierzchni od około 400 cm² do 800 cm².
- Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną – diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Diclozajia jest również przeciwwskazany u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne wywołują napady astmy, pokrzywki oraz ostre nieżyty nosa.
- Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Diclozajia u dzieci poniżej 14 lat.
- Nie stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem:

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

- pęcherzykowe zapalenie skóry (wysypka skórna z pęcherzykami).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

- pokrzywka i inne reakcje nadwrażliwości, astma (trudności w oddychaniu, płytki oddech),
- obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła i krtani).

Pozostałe działania niepożądane:**Często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 osób):**

- wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry), świąd.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości na światło,
- wysypka grudkowata.

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (np. działań niepożądanych dotyczących układu pokarmowego, takich jak wrzody żołądka lub działań niepożądanych w obrębie układu nerwowego, takich jak zawroty czy bóle głowy) w przypadku stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry lub podczas długotrwałego stosowania.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Dostępność ogólnoustrojowa diklofenaku (ilość diklofenaku we krwi) po podaniu na skórę jest niewielka, dlatego prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest małe. Należy unikać równoczesnego stosowania innych produktów na leczonej powierzchni skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
- Lek stosować na nieuszkodzoną powierzchnię skóry.
- Żel można stosować z przepuszczającymi powietrze opatrunkami nieokluzyjnymi.
- Nie należy stosować leku z nieprzepuszczającymi powietrza opatrunkami okluzyjnymi.
- Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami.
- Nie połykać.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym użyciu: 2 lata.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Producent: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.
Adres: ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk
E-mail: ziaja@ziaja.com