

Dicopeg Junior Free makrogol 30 saszetek



Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Vitis Pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Dicopeg Junior Free, Makrogol 3350, 30 saszetek po 5 g

Dicopeg Junior Free jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit.

- nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach.
- nie podrażnia błony śluzowej.
- jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.

Dicopeg Junior Free jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dicopeg Junior Free zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnianie, przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu

Skład:

- Makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny

1 saszетка zawiera 5g makrogolu 3350.

Zalecane dawkowanie:

Dicopeg Junior Free ma postać proszku do sporządzenia roztworu doustnego

Zalecane dawkowanie (Dicopeg Junior Free 5 g):

- Od 6 miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 1-2 saszetki dziennie
- Od 2 do 11 roku życia (od 12 kg do 20 kg): 2-4 saszetki dziennie
- Powyżej 11 roku życia (lub > 20 kg): 2-6 saszetek dziennie

Sposób stosowania:

- Rozpuścić saszetkę (5 g) w ok. 62,5 ml wody lub innego płynu, takiego jak herbata, mleko, napary ziołowe, rosół lub soki owocowe.
- Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach.
- Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości płynu i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny.
- Zaleca się zażywać **DICOPEG JUNIOR FREE** w długich odstępach czasu od posiłków.

Dawka może być odpowiednio zwiększana lub zmniejszana w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na preparat. Prawidłową dawkę dzienną należy określić w oparciu o wagę dziecka i stopień zaparcia. W każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem.

Podawać małym dzieciom tylko w oparciu o wskazania lekarza. Maksymalna konieczna dzienna dawka zazwyczaj nie przekracza 30 g produktu na dobę (6 saszetek).

Działania niepożądane:

- Szczególnie w początkowej fazie przyjmowania preparatu mogą pojawić się zaburzenia ze strony układu pokarmowego (ból brzucha, burczenie w brzuchu, biegunka lub nietrzymanie stolca), ponadto nudności, lekkie wymioty, wzdęcia, gazy jelitowe, zapalenie i podrażnienie okolicy odbytu.
- Dolegliwości zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu stosowanej dawki.
- Bardzo rzadko występują reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Innymi reakcjami alergicznymi jest świąd, pokrzywka i duszność. Jeśli działania niepożądane będą w dalszym ciągu występowały, należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Kiedy nie należy stosować wyrobu:

- Nie stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
- Stosowanie preparatu nie jest wskazane w przypadku: perforacji lub niedrożności jelit spowodowanej zaburzeniami budowy lub działania ścian jelit, jelita krętego, w przypadku schorzeń jelit o charakterze zapalnym, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na makrogol (glikol polietylenowy).
- Nie stosować w przypadku występowania uszkodzeń żołądka lub jelit.

- Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z wcześniej otwartej saszetki (narażenie na ryzyko skażenia produktu).

Interakcje z innymi lekami:

- Nie stwierdzono interakcji preparatu z żadnymi lekami, wyrobami medycznymi i suplementami diety, ale zaleca się jego przyjmowanie w odstępie co najmniej 2 godzin od momentu ich zażycia, ponieważ właściwości osmotyczne makrogolu i wywołany tym przyspieszony pasaż jelitowy mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na skuteczność ich działania.
- W przypadku stosowania innych leków, przed zażyciem DICOPEGU JUNIOR należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia:

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie przekraczać zalecanych dawek.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu zbiorczym i na saszetce
- Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z otwartej dawniej saszetki (naraża to na ryzyko skażenia produktu).
- Nie podawać dzieciom poniżej 6 miesiąca życia
- Podczas stosowania Dicopegu należy przestrzegać odpowiedniej diety, uwzględniającej spożywanie doustnego płynu nawadniającego (DPN), który pozwoli uniknąć odwodnienia.
- Nie stosować Dicopegu dłużej niż 30 dni, jeśli zaparcia nie ustąpiły należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C
- Chronić od światła.
- Podana data przydatności do spożycia odnosi się do produktu poprawnie przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0426
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie zawiera glutenu
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu

Zawartość : 30 saszetek po 5 g makrogolu 3350

Producent:

SIIT Srl, Via ARIOSTO Włochy

Dystrybutor:

Vitis Pharma Sp. z o.o. ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa