

# Dicopeg Junior Free proszek do sporządzania zawiesiny 100g



Cena: 37,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Vitis Pharma
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Dicopeg Junior Free, proszek, 100 g

Dicopeg Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit.

- Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach.
- Nie podrażnia błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.

Dicopeg Junior jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit

## Skład:

- Makrogol 3350.

## Zalecane dawkowanie:

Dicopeg Junior Free ma postać proszku do sporządzenia roztworu doustnego

Zalecane dawkowanie:

- **Niemowlęta od 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12kg)** - podawać dziennie 0,8g produktu na kilogram masy ciała
- **Dzieci od 2. do 11. roku życia (12-20kg)** - podawać dziennie 1g produktu na kilogram masy ciała
- **Dzieci powyżej 11. roku życia (lub powyżej 20kg)** - podawać 10-30g produktu dziennie

Sposób stosowania:

- Przy pomocy miarki odmierzyć zalecaną porcję produktu.
- Pełny dozownik (2g) należy rozpuścić w małej ilości wody - 1/4 szklanki i wypić przygotowany roztwór.
- Dzienną dawkę można zażyć jednorazowo lub podzielić na porcje.
- Gotowy roztwór można przechowywać w lodówce do 24 godzin.
- Podawać Dicopeg Junior w długich odstępach czasowych od posiłków
- **Preparat do stosowania z wodą i innymi płynami**

Dawka może być odpowiednio zwiększana lub zmniejszana w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na preparat. Prawidłową dawkę dzienną należy określić w oparciu o wagę dziecka i stopień zaparcia. W każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem.

## Działania niepożądane:

- Szczególnie w początkowej fazie przyjmowania preparatu mogą pojawić się zaburzenia ze strony układu pokarmowego (ból brzucha, burczenie w brzuchu, biegunka lub nietrzymanie stolca), ponadto nudności, lekkie wymioty, wzdęcia, gazy jelitowe, zapalenie i podrażnienie okolicy odbytu.
- Dolegliwości zazwyczaj ustępują po zmniejszeniu stosowanej dawki.
- Bardzo rzadko występują reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Innymi reakcjami alergicznymi jest świąd, pokrzywka i duszność. Jeśli działania niepożądane będą w dalszym ciągu występowały, należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

## Kiedy nie należy stosować wyrobu:

- Nie stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
- Stosowanie preparatu nie jest wskazane w przypadku: perforacji lub niedrożności jelit spowodowanej zaburzeniami budowy lub działania ścian jelit, jelita krętego, w przypadku schorzeń jelit o charakterze zapalnym, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na makrogol (glikol polietylenowy).
- Nie stosować w przypadku występowania uszkodzeń żołądka lub jelit.
- Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z wcześniej otwartej saszetki (narażenie na ryzyko skażenia produktu).

## Interakcje z innymi lekami:

- Nie stwierdzono interakcji preparatu z żadnymi lekami, wyrobami medycznymi i suplementami diety, ale zaleca się jego przyjmowanie w odstępie co najmniej 2 godzin od momentu ich zażycia, ponieważ właściwości osmotyczne makrogolu i wywołany tym przyspieszony pasaż jelitowy mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na skuteczność ich działania.
- W przypadku stosowania innych leków, przed zażyciem DICOPEGU JUNIOR należy skonsultować się z lekarzem.

## Ostrzeżenia:

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie przekraczać zalecanych dawek.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie podawać dzieciom poniżej 6 miesiąca życia
- Podczas stosowania Dicopegu należy przestrzegać odpowiedniej diety, uwzględniającej spożywanie doustnego płynu nawadniającego (DPN), który pozwoli uniknąć odwodnienia.
- Nie stosować Dicopegu dłużej niż 30 dni, jeśli zaparcia nie ustąpiły należy skontaktować się z lekarzem.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C
- Chronić od światła.
- Podana data przydatności do spożycia odnosi się do produktu poprawnie przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu.
- Termin trwałości preparatu po otwarciu pojemnika wynosi 2 miesiące.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0426
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- **Nie zawiera glutenu**
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu

Zawartość: Opakowanie 100g

## Producent:

SIIT Srl, Via ARIOSTO Włochy

## Dystrybutor:

Vitis Pharma Sp. z o.o. ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa