


Dicopeg makrogol 3350 zaparcia x 14 saszetek



Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Vitis Pharma
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Dicopeg, Makrogol 3350, 14 saszetek po 10 g

Osmotyczne działanie przeczyszczające

Dicopeg jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit.

- nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach.
- nie podrażnia błony śluzowej.
- jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.

Dicopeg jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym

Dicopeg zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.

Skład:

Makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny.

Zalecane dawkowanie:

Dicopeg ma postać proszku do sporządzenia roztworu doustnego.

Zalecane dawkowanie (Dicopeg 10 g):

- Od 6. miesiąca ca z ycia do 2 lat (do 12 kg): 1 saszetka/dobę
- Od 2. do 11. roku z ycia (od 12 kg do 20 kg): 1-2 saszetki/dobę
- Powyżej 11. roku z ycia (lub > 20 kg): 1-3 saszetki/dobę

Sposób stosowania:

- Należy rozpuścić zawartość saszetki w 1 szklance wody (125 ml) i wypić sporządzony roztwór.
- Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości wody i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny.
- Zaleca się zażywać Dicopeg w długich odstępach czasu od posiłków.
- Dawkę dzienną można dzielić na kilka podaniach.

Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Zaleca się w tym celu skonsultować z lekarzem.

Przed podawaniem produktu małym dzieciom należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Zazwyczaj największa potrzebna dawka dzienna nie przekracza 3 saszetek.

Kiedy nie należy stosować wyrobu:

- Nie należy stosować Dicopegu w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na makrogol (glikol polietylenowy), w przypadku perforacji i/lub niedrożności układu pokarmowego, zmian chorobowych układu pokarmowego lub wydalniczego, poważnych chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.
- W okresie ciąży i karmienia produkt stosuje się tylko po przepisaniu przez lekarza.

Interakcje z innymi lekami:

- Nie stwierdzono interakcji preparatu z żadnymi lekami, wyrobami medycznymi i suplementami diety, ale zaleca się jego przyjmowanie w odstępie co najmniej 2 godzin od momentu ich zażycia, ponieważ właściwości osmotyczne makrogolu i wywołany tym przyspieszony pasaż jelitowy mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na skuteczność ich działania.
- W przypadku stosowania innych preparatów, przed zażyciem Dicopegu należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie niepożądane:

- W początkowym okresie terapii mogą wystąpić zaburzenia układu pokarmowego (ból brzucha, burczenie w brzuchu, biegunka, nietrzymanie kału, nudności, lekkie wymioty, wzdęcia, wiatry, stany zapalne i podrażnienie okolic odbytu), ale zazwyczaj znikają w dalszym okresie zażywania lub po zmniejszeniu dawki.
- Jeśli powyższe dolegliwości utrzymują się, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypka skórna, pokrzywka, świąd, duszności).
- Należy wtedy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie:

- W przypadku przedawkowania mogą wystąpić silne bóle, wzdęcie, biegunka, zaburzenie równowagi elektrolitycznej.
- Powyższe objawy ustępują samoistnie po przerwaniu leczenia, należy jednak niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia:

- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
- Nie przekraczać zalecanych dawek.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu zbiorczym i na saszetce
- Produkt jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z otwartej dawniej saszetki (naraża to na ryzyko skażenia produktu).
- Nie podawać dzieciom poniżej 6 miesiąca życia
- Podczas stosowania Dicopegu należy przestrzegać odpowiedniej diety, uwzględniającej spożywanie doustnego płynu nawadniającego (DPN), który pozwoli uniknąć odwodnienia.
- Nie stosować Dicopegu dłużej niż 30 dni, jeśli zaparcia nie ustąpiły należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C
- Chronić od światła.
- Podana data przydatności do spożycia odnosi się do produktu poprawnie przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0426
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- **Nie zawiera glutenu.**
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu.

Zawartość : 14 saszetek po 10 g makroglu 3350

Producent:

SIIT Srl, Via ARIOSTO Włochy

Dystrybutor:

Vitis Pharma Sp. z o.o. ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa