

Difortan, żel 100 mg/g, 100 g

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Usp zdrowie
Substancja czynna	Etofenamatum
Typ produktu	



Opis produktu

Lek bez recepty

Difortan, żel 100 mg/ g - 100 g

(Etofenamatum)

Opis produktu:

Żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, polecany w bólach mięśni, stawów i kości.

Skład:

- Substancja czynna - etofenamatum (Etofenamatum).
- Substancje pomocnicze - alkohol izopropylowy, glicerol, trolamina, karbomery, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 100 mg etofenamat.

Wskazania:

- Miejscowe leczenie łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni;
- stłuczenia;

- ból pourazowy;
- łagodny i umiarkowany ból reumatyczny (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów);
- łagodny i umiarkowany ból stawów;
- miejscowe leczenie zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien;
- umiarkowany stan zapalny pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego.

Działanie:

- Lek Difortan działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stłuczenia, naciągnięcia, zwichnięcia - od 3 do 4 aplikacji na dobę

choroby reumatyczne - od 2 do 3 aplikacji na dobę

- Przed i po użyciu preparatu należy umyć ręce.
- Lek należy rozprowadzić na bolący obszar poprzez delikatne wcieranie.
- Jeśli objawy nie miną po 7 dniach lub nastąpi ich pogorszenie, to należy zgłosić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Nie stosować leku **Difortan**:

- u kobiet w ciąży,
- na uszkodzoną lub zakażoną skórę, w tym obszary skóry z ranami i wypryskiem,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 osób):

- świąd,
- rumień,
- miejscowe podrażnienie skóry, które zwykle zanika po przerwaniu leczenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 osób):

- kontaktowe zapalenie skóry,
- alergiczne zapalenie skóry,
- fotodermatoza.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

- pokrzywka,
- zmiany pęcherzowe,
- toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek **Difortan** może zmienić działanie innych przyjmowanych leków. Aby to nastąpiło, **Difortan**, nakładany na skórę, musi zostać wchłonięty do krwiobiegu. Ponieważ lek **Difortan** wchłania się w nieznacznej ilości do krwiobiegu, jest mało prawdopodobne, że będzie wpływał na działanie innych leków.

Lek **Difortan** może wpływać na działanie:

- leków stosowanych w celu kontrolowania ciśnienia krwi, w tym leków moczopędnych,
- leków stosowanych w celu rozcieńczenia krwi,
- litu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Chronić posmarowaną skórę przed światłem słonecznym.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- **Difortan jest ważny do 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.**

Podmiot odpowiedzialny:

USP ZDROWIE SP.ZO.O., Poleczki 35, Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.