

## Dih comfort max 1000 mg x 30 tabletek powlekanych

Cena: 31,99 PLN



### Opis słownikowy

Producent /  
Marka PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI  
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Substancja  
czynna Diosminum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

## Dih Comfort Max, 1000 mg, 30 tabletek powlekanych

(Diosminum)

### Wskazania:

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

- bóle i nocne kurcze nóg
- uczucie ciężkości nóg
- żylaki kończyn dolnych
- poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajęczki naczyniowe
- obrzęki nóg (opuchlizna, puchnięcie nóg)
- objawowe leczenie żylaków odbytu

### Działanie:

•

zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia

## Skład:

- **Substancją czynną leku jest:** zmikronizowana diosmina
- **Pozostałe składniki leku to:** celuloza mikrokryształiczna, powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, otoczka Opadry II Pink 85F24220 o składzie: alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany, makrogol/PEG MW 3350, makrogol 4000 JP, talk, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171)

1 tabletkę powlekaną zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

## Stosowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Podanie doustne.

- zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletkę powlekaną na dobę podczas posiłku.
- jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawanie większych dawek: po 1 tabletkę powlekaną 3 razy na dobę przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletkę powlekaną 2 razy na dobę, rano i wieczorem.
- jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu nie ustąpią lub nasilą się mimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem
- lek podaje się podczas posiłku

## Przeciwwskazania:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu nie ustąpią lub nasilą się mimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem
- w przypadku objawów związanych z żylakami odbytu leczenie lekiem DIH MAX COMFORT powinno być objawowe i krótkotrwałe.

### Lek DIH MAX COMFORT zawiera sód:

- ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

## Interakcje z innymi produktami leczniczymi:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- z uwagi na brak wystarczających danych, lek DIH MAX COMFORT może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności
- nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania

## Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- przyjmowanie leku DIH MAX COMFORT nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

## Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):**

- niestrawność
- nudności
- wymioty
- zawroty głowy, ból głowy
- złe samopoczucie
- wysypka, świąd, pokrzywka

W przypadku łagodnych działań niepożądanych dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń neurovegetatywnych (bezsennosc, trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój) nie jest wymagane odstawienie leku

## Przechowywanie:

- lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 tabletek powlekanych, umieszczonych w tekturowym pudełku

## Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.