

DIH Max comfort, 1000 mg, 60 tabletek



Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Diosminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

DIH Max Comfort 1000 mg - 60 tabletek

(Diosminum)

Opis produktu:

DIH Max Comfort 1000 mg to lek w postaci tabletek powlekanych. Substancją czynną leku jest diosmina, która jest związkiem należącym do tzw. bioflawonoidów. Lek działa poprzez zwiększenie napięcia w naczyniach żylnych oraz działa na nie ochronnie.

Skład:

- **Substancja czynna:** diosmina
- **Substancje pomocnicze:** celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian. Otoczka Opadry IIPink 85F24220 o składzie: alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, makrogol/PEG MW 3350, makrogol 4000 JP, talk, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

1 tabletkę zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

Wskazania:

DIH Max Cmofort jest stosowany u pacjentów w przypadku objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

- bóle i nocne kurcze nóg,
- uczucie ciężkości nóg,
- żylaki kończyn dolnych,
- poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajęczki naczyniowe,
- obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg),
- w objawowym leczeniu żylaków odbytu (hemoroidów).

Działanie:

- **zwiększa napięcie naczyń żylnych** oraz działa ochronnie na naczynia; zwiększa drenaż limfatyczny,
- **wpływa na mikrokrążenie**, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu,
- zmniejsza również podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- **Zazwyczaj stosowana dawka leku to** - 1 tabletkę powlekaną na dobę podczas posiłku.
- **Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się okresowe podawanie większych dawek:** po 1 tabletkę powlekaną 3 razy na dobę przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni po 1 tabletkę powlekaną 2 razy na dobę, rano i wieczorem.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na diosminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- niestrawność,
- nudności,
- wymioty,
- zawroty głowy,
- ból głowy,
- złe samopoczucie,

- wysypka, świąd, pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie leku w przypadku zaostrzenia stanu żyłaków odbytu powinno być krótkotrwałe i jest to leczenie objawowe. Stosowanie tego leku nie wyklucza konieczności stosowania innych leków doodbytniczych.
- W przypadku zaburzonego krążenia żylnego w nogach należy wziąć pod uwagę zmianę trybu życia: unikanie ekspozycji słonecznej i przebywania w pozycji stojącej dłuższy czas, kontrolę wagi, noszenie specjalnych pończoch.
- W przypadku pogorszenia się objawów zaburzonego przepływu żylnego - stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenia skóry - należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek jest nieskuteczny w przypadku obrzęków spowodowanych chorobami serca, nerek lub wątroby.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

- Diosmina może zwiększać stężenie we krwi i obniżyć wydalanie metronidazolu (lek o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwprzywrotniakowym) i diklofenaku (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny).

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e, Wrocław.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym