

# DiosMax 1000 mg 60 tabletek powlekanych



Cena: 39,85 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka

Olimp laboratories

Substancja  
czynna

Diosminum

Typ produktu

## Opis produktu

## Lek wydawany bez recepty

### Diosmax 1000 mg - 60 tabletek

### (Diosminum)

## Opis produktu:

DiosMax to lek zawierający zmikronizowaną diosminę. Diosmina zwiększa napięcie i elastyczność naczyń żylnych oraz działa osłaniająco na naczynia. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, przez co przyczynia się do poprawy krążenia żylnego

## Skład:

- substancją czynną jest - diosmina (Diosminum)
- substancje pomocnicze - rdzeń tabletki (celuloza mikrokryształiczna, kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna), otoczka Opadry II Clear (alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk)

1 tabletkę zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy

## Wskazania:

- leczenie objawów występujących w przewlekłej niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych, takich jak: obrzęki, uczucie zmęczenia, ból i ciężkość nóg, pieczenie, nocne kurcze oraz poszerzenie bardzo drobnych naczyń żylnych (tzw.

„pajęczki”);

- objawowe leczenie żylaków kończyn dolnych
- zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidów)

## Działanie:

- Diosmina zwiększa napięcie i elastyczność naczyń żylnych oraz działa osłaniająco na naczynia
- zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, przez co przyczynia się do poprawy krążenia żylnego
- zwiększa drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę (ruchy) naczyń chłonnych i przepływ limfy oraz poprawia powrót krwi z układu żylnego oraz zmniejsza zastój żylny i (lub) nadciśnienie w kończynach dolnych
- Diosmina zmniejsza też przepuszczalność małych naczyń krwionośnych – ogranicza stany zapalne, zwłaszcza w zapaleniach około żylnych. Poprzez przywrócenie naczyniom włosowatym prawidłowej przepuszczalności zmniejsza podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych:

- zalecana dawka to 1 tabletkę raz na dobę, podczas posiłku. W celu uzyskania poprawy, lek ten należy stosować przez co najmniej 4 do 5 tygodni

### Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu:

- zalecana dawka to 1 tabletkę 3 razy na dobę przez pierwsze 4 dni leczenia, a następnie jedna tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

Jeśli objawy nasilią się lub nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- 

jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

### Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

- dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból

- brzocho, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty,
- zaparcia),
- bóle i zawroty głowy

**W pojedynczych przypadkach na początku leczenia (przez pierwsze 4 dni) może wystąpić:**

- świąd lub pokrzywka

Leki z diosminą, w większości przypadków są dobrze tolerowane, a wystąpienie któregośkolwiek z wyżej wymienionych objawów niepożądanych nie powoduje konieczności odstawienia leku

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

**W szczególności należy poinformować o stosowaniu:**

- metronidazolu (lek przeciwbakteryjny) – działanie metronidazolu może się nasilić
- diklofenaku (lek przeciwzapalny, przeciwbólowy) – działanie diklofenaku może się nasilić
- feksofenadyny (lek przeciwalergiczny) – działanie feksofenadyny może się nasilić
- karbamazepiny (lek przeciwpadaczkowy) – działanie karbamazepiny może się nasilić

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

**Przed rozpoczęciem stosowania leku DiosMax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:**

- zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu
- należy pamiętać, że terapia lekiem DiosMax jest wyłącznie objawowa i powinna być ona krótkotrwała
- jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem
- przewlekła niewydolność krążenia żylnego, jeżeli objawy choroby ulegają pogorszeniu w trakcie leczenia, tzn. obserwuje się stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenie skóry lub gdy występują nietypowe objawy, takie jak np. gwałtowny obrzęk jednej lub obu nóg, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
- skuteczność terapii można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia tj. unikanie długotrwałej ekspozycji słonecznej, unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, redukcję nadwagi, kontrolowanie prawidłowej masy ciała, noszenie specjalnych pończoch uciskowych, aktywność fizyczną
- DiosMax nie jest skuteczny w przypadku gdy obrzęki kończyn dolnych są spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

### Ciąża

- Nie zaleca się stosowania produktów leczniczych zawierających diosminę w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej

### Karmienie piersią

- leku nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią, ze względu na brak danych na temat przenikania leku do mleka matki

### Płodność

- brak danych wskazujących na możliwość wpływu tego leku na płodność

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. Pustynia 84F 39-200 Dębica

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

