

Diosminex, 500 mg diosmina, żylaki, 60 tabletek



Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Bausch Health

Substancja
czynna Diosminum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Diosminex 500 mg - 60 tabletek

(Diosminum)

Opis produktu:

Diosminex to lek zawierający zmikronizowaną diosminę. Substancja czynna zawarta w tabletkach zwiększa napięcie naczyń żylnych. Dodatkowo składnik ten działa ochronnie na naczynia krwionośne poprzez zmniejszenie ich przepuszczalność oraz obniżenie podatność na pęknięcie.

Skład:

- Substancja czynna: diosmina
- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka: talk, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, żółcień chinolinowa, lak (E 104), indygotyna, lak (E 132), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), żelaza tlenek czarny (E 172).

1 tabletkę zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy.

Wskazania:

- Wskazaniem do stosowania leku Diosminex 500 mg jest leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia

żylnego u dorosłych, takich jak uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze nóg.

- Preparat może być także stosowany w leczeniu objawowym w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych.

Działanie:

Diosminex pomaga w leczeniu objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego:

- zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia; zwiększa drenaż limfatyczny,
- wpływa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu,
- zmniejsza również podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnnej:

- **Dorośli:** 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem podczas posiłku.

Leczenie zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu:

- **Dorośli:** 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na diosminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- biegunka, niestrawność, nudności, wymioty,
- zawroty głowy, ból głowy,
- złe samopoczucie,
- wysypka, świąd, pokrzywka.

W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurovegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyspieszone bicie serca, nadmierna potliwość, lęklliwość) nie jest wymagane odstawienie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie leku w przypadku zaostrzenia stanu żyłaków odbytu powinno być krótkotrwałe i jest to leczenie objawowe. Stosowanie tego leku nie wyklucza konieczności stosowania innych leków doodbytniczych.
- W przypadku zaburzonego krążenia żylnego w nogach należy wziąć pod uwagę zmianę trybu życia: unikanie ekspozycji słonecznej i przebywania w pozycji stojącej dłuższy czas, kontrolę wagi, noszenie specjalnych pończoch.
- W przypadku pogorszenia się objawów zaburzonego przepływu żylnego - stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenia skóry - należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek jest nieskuteczny w przypadku obrzęków spowodowanych chorobami serca, nerek lub wątroby.
- Lek zawiera laktozę - w przypadku stwierdzonej nietolerancji, stosowanie leku skonsultować z lekarzem.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

- Diosmina może zwiększać stężenie we krwi i obniżać wydalanie metronidazolu (lek o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym) i diklofenaku (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny).

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Bausch Health Ireland Limited

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd,

poinformuj nas o tym