

# Dip Hot, Rozgrzewający krem, lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, 67g



Cena: 22,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Colep
Substancja czynna	Methylis salicylas, Mentolum, Eucalyptus, Terebinthinae aetheroleum a pino pinastro
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Dip Hot, Rozgrzewający krem - 67 g

(Methylis salicylas, Mentolum, Eucalyptus, Terebinthinae aetheroleum a pino pinastro)

### Opis produktu:

Dip Hot Rozgrzewający to produkt leczniczy do stosowania miejscowego i objawowego m.in. w bólach mięśniowych i stawowych, w urazach (skręcenia, stłuczenia stawów), w rwie kulszowej. Lek wykazuje miejscowe działanie rozgrzewające, przeciwbólowe i przeciwzapalne.

### Skład:

- **Substancją czynną** kremu jest salicylan metylu (Methylis salicylas), mentol (Mentolum), olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum), olejek terpentynowy (Terebinthini aetheroleum).

1 g kremu zawiera 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego.

- **Pozostałe składniki:** glikol propylenowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, cetostearylosiarczan sodowy, lanolina, woda.

### Wskazania:

- bóle mięśniowe,
- bóle stawowe,
- bóle reumatyczne,
- stłuczenia i skręcenia stawów,
- rwa kulszowa,
- pomocniczo w goścu,
- po treningach u sportowców,

## Działanie:

- **Dip Hot Rozgrzewający** wykazuje **działanie znieczulające (dzięki zawartości mentolu), rozgrzewające, a także łagodzi odczuwany ból**. Salicylan metylu **wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe**. Efekt rozgrzewający uzyskuje się poprzez wpływ na obwodowe naczynia krwionośne poprzez ich rozszerzenie i odpowiednio przekrwienie tkanek.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Młodzież powyżej 12 lat i dorośli:** 2-3 razy na dobę stosować na bolące miejsca. Krem wcierać do całkowitego wchłonięcia się. Po aplikacji należy pamiętać o dokładnym zakręceniu tuby i umyciu rąk (z wyłączeniem sytuacji, gdy są one miejscem stosowania leku).
- Lek do stosowania miejscowego na skórę.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować tego leku:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- na uszkodzoną skórę,
- u dzieci poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten powoduje działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

**Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):**

- zaczerwienienie skóry (rumień),
- duszności u osób nadwrażliwych.

**Częstość nieznaną:**

- oparzenia w miejscu podania.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Stosowanie leku należy przerwać w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry.
- Podczas stosowania należy unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.
- Lek zawiera lanolinę i alkohol cetostearylowy, czyli składniki, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może podrażniać skórę.
- Stosowanie leku u osób z astmą oskrzelową należy omówić z lekarzem - ryzyko wystąpienia odruchu skurczu oskrzeli.

### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować tego leku przeciwwirusowego na opryszczkę u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Dip Hot Rozgrzewający** może wchodzić w interakcje z:

- lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi (działanie to może nasilić się).

## Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- **Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 18 miesięcy.**

## Podmiot odpowiedzialny:

Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Niemcy

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym