

Dip Rilif, że, lek, przeciwbólowy, przeciwzapalny, 100g



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Colep
Substancja czynna	Ibuprofenum, Mentholum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Dip Rilif (50 mg+30 mg/g), żel - 100g

(Ibuprofenum, Mentholum)

Opis produktu:

Dip Rilif to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, łagodzącym obrzęk do stosowania w bólach różnego pochodzenia (reumatycznych, mięśniowych, pleców) z towarzyszącym obrzękiem.

Skład:

Substancjami czynnymi są: ibuprofen (Ibuprofenum) i mentol (Mentholum).

Substancje pomocnicze: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.

Wskazania:

Miejscowe leczenie dolegliwości bólowych i zapalnych w:

- bólach reumatycznych,
- bólach mięśniowych, bólach pleców,

- obrzęku i bólu z powodu urazu, kontuzji m.in. sportowych (kontuzje stawowe i skręcenia stawów),
- bólu ścięgien, więzadeł i tkanki włóknistej,
- lumbago.

Działanie:

- Dip Rilif wykazuje **działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne** dzięki zawartości **ibuprofenu**, który należy do grupy leków NLPZ. **Mentol** zawarty w leku łagodzi **dolegliwości bólowe mięśni, ścięgien i stawów poprzez miejscowe działanie powodujące zaczerwienienie i przekrwienie skóry.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania miejscowego na skórę.
- Na miejsce posmarowane żelem, nie należy zakładać żadnych opatrunków (plastrów i bandaży).

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie aplikować żel na miejsce bolesne, ale nie częściej co 4 godziny. Zwykle stosuje się od 1 do 4 cm żelu, który należy delikatnie wmasować do wchłonięcia.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

Nie stosować leku **Dip Rilif**:

- jeśli w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, inne leki z grupy NLPZ,
- u pacjentów z astmą, u których w przeszłości występował m.in. napad duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa,
- na wargi, nozdrza, błony śluzowe, okolice narządów moczowo-płciowych; do oczu i skórę w ich okolicy; na skórę zmienioną zapalnie lub uszkodzoną,
- u osób poniżej 12 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, **Metafen żel Forte** może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- reakcje miejscowe np. zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, pokrzywka, oparzenia w miejscu stosowania,
- zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego jak bóle brzucha, niestrawność,
- napady duszności u osób predysponowanych (osoby z astmą, chorobami alergicznymi).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje ibuprofenu podanego miejscowo z innymi lekami, ale ze względu na fakt, iż występują one przy podaniu doustnym to nie można ich wykluczyć.

- Stosowanie razem z kwasem acetylosalicylowym i innymi NLPZ może spowodować częstsze występowanie działań niepożądanych.
- Ibuprofen podany doustnie może wchodzić w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.
- Ibuprofen połączony z kwasem acetylosalicylowym może nieodwracalnie znosić efekt hamowania agregacji, a przez to jego ochronny wpływ na serce u osób z ryzykiem zawału zostaje ograniczony.
- Łączenie NLPZ z kortykosteroidami może zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej przewodu pokarmowego.
- U pacjentów zażywających leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol) albo czynniki trombolityczne (np. streptokinaza) ibuprofen może hamować agregację płytek krwi, co może w konsekwencji powodować krwawienia z przewodu pokarmowego i wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.
- Ibuprofen zwiększa toksyczne działanie metotreksatu, zmniejsza działanie leków moczopędnych oraz zwiększa stężenie podawanego litu w osoczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli u pacjenta występuje alergia na leki lub kosmetyki, choroba nerek, choroba wrzodowa, są przyjmowane leki z grupy NLPZ w tym kwas acetylosalicylowy,
- Jeśli u pacjenta wystąpiła pokrzywka lub podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku.
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Dzieci i młodzież:

- Nie należy stosować leku u osób poniżej 12. roku życia.

Ciąża, karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 3 miesiące.

Podmiot odpowiedzialny:

Colep Laupheim GmbH, Laupheim, Niemcy

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.