

# Dolgit 50 mg/g, krem, przeciwbólowy, 100 g



Cena: 35,89 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Dolgiyet
Substancja czynna	Ibuprofenum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Dolgit 50 mg/g, krem - 100 g

(Ibuprofenum)

## Opis produktu:

Dolgit to lek w postaci kremu, stosowany miejscowo w przypadku bólów mięśni, zwyrodnień stawowych, reumatyzmy, stanów zapalnych elementów okołostawowych. Lek zawiera ibuprofen, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.

## Skład:

- Substancja czynna - ibuprofen
- Substancje pomocnicze - triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerolu monostearynian, makrogolo-30-glicerolu monostearynian, makrogolo-100-glicerolu monostearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, guma ksantan, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.

1 g kremu zawiera 50 mg ibuprofenu.

## Wskazania:

- miejscowe leczenie bólów mięśni;

- **leczenie bólów** w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa;
- **leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych** ( np. kałek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych);
- **leczenie** bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub wypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

## Działanie:

Dolgit zawiera ibuprofen, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.

- Przeciwbólowe
- przeciwzapalne.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do miejscowego stosowania na skórę.
- Leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny.
- W przypadku braku poprawy po upływie 10 dni od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem.
- Dawka dobową wynosi 12 g kremu, czyli 600 mg ibuprofenu.

**Dorośli i młodzież od 14 lat** - od 3 do 4 razy na dobę pasek kremu o długości 4-10 cm (2 g do 5 g, co odpowiada 100 do 250 mg ibuprofenu). Krem zwykle nakłada się na skórę i wciera.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- otwarte rany,
- jeśli pacjent ma alergię na ASA (kwas acetylosalicylowy) lub inne leki z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych),
- jeśli w przeszłości po zastosowaniu ASA lub innego NLPZ wystąpiły: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa, astma.
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat,
- ciąża, laktacja.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):**

- niespecyficzne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, mrowienie w miejscu podania, astma, pogorszenie stanu astmatycznego, duszność, skurcz oskrzeli, wysypki różnego typu, świąd pokrzywka, choroby pęcherzowe skóry, ból brzucha, niestrawność.

## Interakcje:

Dolgit może wchodzić w interakcje z:

- innymi lekami z grupy NLPZ.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Dolgit zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.
- Dolgit zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy - może powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.
- Leku nie należy stosować na otwarte rany, w okolicach oczu oraz na błony śluzowe.
- Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nietolerancją ASA, ibuprofenu i innych leków NLPZ.
- W przypadku wystąpienia wysypki, należy zaprzestać stosowania leku.
- Po zastosowaniu kremu, należy umyć ręce jeśli nie zachodzi konieczność smarowania rąk w celach leczniczych.

Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci poniżej 14 roku życia.

Stosowanie z jedzeniem i pićem:

- Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, albo z dużą ilością wody lub mleka. Alkohol może nasilać działania niepożądane.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Stosowanie leku Dolgit w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.
- Nie należy stosować leku Dolgit w okresie karmienia piersią .

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

DOLORGIET PHARMACEUTICALS, Otto-von-Guericke-Str. 1, 53757 Sankt Augustin, Niemcy.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.