

Ectodose, roztwór do inhalacji z ektoiną, 20 amp.x 2,5ml



Cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Solinea
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Ectodose, roztwór do inhalacji z ektoiną - 2,5 ml x 20 ampułek

Opis produktu:

Roztwór Ectodose zawiera ektoinę (Ectoin), naturalną substancję, która stabilizuje błony komórkowe, pomaga chronić komórki przed oddziaływaniem szkodliwych czynników i łagodzić stany zapalne. Stosowany w postaci inhalacji, roztwór Ectodose wspomaga leczenie stanów zapalnych i łagodzenie objawów chorób układu oddechowego, dzięki działaniu nawilżającemu i ochronnemu na błonę śluzową układu oddechowego.

Preparat może być podawany za pomocą nebulizatorów różnego rodzaju: pneumatycznego, siateczkowego i ultradźwiękowego.

Skład:

Ektoina 1,3% (Ectoin®), sól morską, woda. Nie zawiera konserwantów.

Wskazania:

Wyrób medyczny Ectodose jest wskazany we wspomaganiu leczenia stanów zapalnych i objawów chorób układu oddechowego, np. przy astmie alergicznej i niealergicznej, zapaleniu oskrzeli, przewlekłej, obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

Działanie:

- Roztwór Ectodose zawiera ektoinę (Ectoin), naturalną substancję, która **stabilizuje błony komórkowe, pomaga chronić komórki przed oddziaływaniem szkodliwych czynników i łagodzić stany zapalne.**

- Stosowany w postaci inhalacji, roztwór Ectodose **wspomaga leczenie stanów zapalnych i łagodzenie objawów chorób układu oddechowego, dzięki działaniu nawilżającemu i ochronnemu na błonę śluzową układu oddechowego.**
- Ectodose **zapobiega wysychaniu błon śluzowych i ułatwia odkrztuszanie, rozrzedzając gęsty śluz.**

Stosowanie:

Ectodose należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

1. O ile lekarz nie zaleci inaczej, Ectodose należy inhalować przy użyciu nebulizatora maksymalnie dwa razy dziennie, w pojedynczej dawce wynoszącej 2,5 ml. Przed inhalacją preparatu należy upewnić się, że inhalator jest czysty i nie ma na nim zabrudzeń. Dzieci do 10 roku życia powinny stosować preparat pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Oderwać ampułkę zawierającą jedną dawkę preparatu i otworzyć ją poprzez przekręcenie górnej części.
3. Zawartość ampułki wlać do nebulizatora (pojemnika na lek). Ze względów produkcyjnych na dnie ampułki może pozostać mała ilość płynu.
4. Używać inhalatora zgodnie z instrukcją producenta.
5. W przypadku dzieci w wieku do 2 lat inhalacja roztworu może wymagać zastosowania specjalnego sprzętu (np. dopasowanej maski dla dzieci). Należy wówczas stosować sprzęt zalecany przez producenta nebulizatora.
6. Roztwór należy inhalować powoli.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Nie należy stosować w przypadku utrzymujących się urazów, np. po operacji w obrębie układu oddechowego.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub inne składniki preparatu.
- W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów ubocznych należy niezwłocznie przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 2-25oC.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie używać roztworu z przebitych ani uszkodzonych opakowań!

Możliwe działania niepożądane:

- Jak każdy wyrób przeznaczony do inhalacji, Ectodose może wywołać skutki uboczne. W pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć niekorzystnego wpływu na występującą astmę.
- W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów należy niezwłocznie przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami:

- Nie stwierdzono interakcji między Ectodose a innymi roztworami do inhalacji.
- Pomiędzy zastosowaniem dawki Ectodose a inhalacją innego wyrobu medycznego lub leku, należy zachować przynajmniej 15-minutowy odstęp czasu.

Ciąża i karmienie piersią:

- Brak danych dotyczących stosowania wyrobu Ectodose w czasie ciąży i karmienia piersią.
- W przypadku ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne:

- **Wyrób medyczny**
- Posiada oznakowanie **CE 0197**
- Posiada deklarację zgodności **UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.