

Eloprine, Forte, 1000mg, lek przeciwwirusowy, odporność, 30 tabletek



Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polfarmex

Substancja
czynna Inosinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Eloprine Forte, 1000mg - 30 tabletek

(Inosinum pranobexum))

Lek Przeciwwirusowy i zwiększający odporność w przypadku: nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

Opis produktu:

Eloprine Forte to produkt leczniczy, którego substancją czynną jest inozyny pranobeks. Lek przeznaczony jest do stosowania wspomagającego u osób powyżej 1 roku życia z obniżoną odpornością, w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy.

Skład:

- Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks(Inosinum pranobexum).
- Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Jedna tabletką zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3.

Wskazania:

- Lek Eloprine Forte jest wskazany do stosowania wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u osób u których w przeszłości rozpoznano zakażenie tym wirusem.

Działanie:

- Eloprine Forte zawiera inozyny pranobeks, który wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):** zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka wynosi 3 tabletki (3 g) na dobę (czyli 1 tabletka 3 razy na dobę). Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.
- **Dzieci w wieku powyżej 1 roku:** Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Eloprine Forte w syropie.
- Tabletkę należy podawać doustnie, popijając odpowiednią ilością płynu. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody
- Czas trwania leczenia wynosi 5-14 dni, po ustąpieniu objawów lek należy podawać jeszcze przez 1-2 dni

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Leku Eloprine forte 1000 mg nie należy stosować:

- jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowe lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Bardzo często** (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu.
- **Często** (występujące nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu moczniowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; dyskomfort w nadbrzuszu; swędzenie, wysypka skórna; ból głowy, zawroty głowy; zmęczenie, złe samopoczucie; bóle stawów.
- **Niezbyt często** (występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów): biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenna); wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).
- **Częstość nieznana** (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ból w nadbrzuszu; obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka, reakcja alergiczna, reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna); zaczerwienienie skóry (rumień).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- **Sz szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje:** leki do leczenia dny moczanowej (np. allopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantynowej); leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid; leki hamujące czynność układu odpornościowego (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry); azydotymidynę (lek stosowany w leczeniu choroby AIDS).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli: w przeszłości występowały u pacjenta napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi oraz moczu; osoba choruje na kamicy nerkową, posiada zaburzenia czynności nerek; zaobserwowano u pacjenta objawy reakcji alergicznej.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy stosować leku Eloprine Forte w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 1. roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Ten lek może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.