

Eloprine Forte, 500 mg/ 5 ml, syrop, 150 ml



Cena: 22,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polfarmex

Substancja
czynna Inosinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Eloprine Forte, 500 mg/5 ml, syrop - 150 ml

(Inosinum pranobexum)

Opis produktu:

Eloprine Forte lek, którego substancją czynną są inozyny pranobeks. Substancja czynna leku **wykazuje działanie przeciwwirusowe i wspomagające pracę układu odpornościowego.**

Skład:

- **Substancja czynna** - inozyny pranobeks
- **Substancje pomocnicze** - metylu parahydroksybenzoesan [E 218], propylu parahydroksybenzoesan [E 216], sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, aromat truskawkowy płynny, woda oczyszczona.

1 ml syropu zawiera 100 mg inozyny pranobeksu w postaci kompleksu.(kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

Wskazania:

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności,
- w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.

Działanie:

- Eloprine forte zawiera inozyny pranobeks, który wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- **Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)** - Zwykle stosowana dawka dobową wynosi 30 ml syropu na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 40 ml syropu na dobę.
- **Dzieci w wieku powyżej 1 roku** - Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta (Masa ciała, Dawkowanie):

- 10 - 14 kg - 3 x 2,5 ml
- 15 - 20 kg - 3 x 2,5 do 3,75 ml
- 21 - 30 kg - 3 x 3,75 do 5 ml
- 31 - 40 kg - 3 x 5 do 7,5 ml
- 41 - 50 kg - 3 x 7,5 do 8,75 ml

Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Inozyny pranobeksu** nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania Eloprine forte należy omówić to z lekarzem:

- jeśli pacjent miał w przeszłości napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu,
- jeśli pacjent miał w przeszłości kamicę nerkową,
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, w takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta.

Syrop po pierwszym otwarciu zachowuje ważność przez 2 lata.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować leku u dzieci w pierwszym roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Jest mało prawdopodobne by lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Produkt leczniczy Eloprine Forte należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów leczonych jednocześnie:

- inhibitorami oksydazy ksantynowej (np. allopurynol);
- lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem, włącznie z diuretykami, w tym diuretykami tiazydowymi (np. hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid) i diuretykami pętlowymi (furosemid, torasemid, kwas etakrynowy).
- Produktu leczniczego Eloprine Forte nie należy przyjmować w trakcie (a jedynie po zakończeniu) terapii lekami immunosupresyjnymi, gdyż jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych może na drodze farmakokinetycznej zmieniać działanie terapeutyczne produktu leczniczego Eloprine Forte.
- Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Eloprine Forte z azydotymidyną (AZT) zwiększa tworzenie nukleotydów przez AZT (wzmocnione działanie AZT), poprzez złożone mechanizmy, m.in. zwiększenie biodostępności AZT w osoczu oraz zwiększenie wewnątrzkomórkowej fosforylacji w monocytach krwi.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Polfarmex S.A, Józefów 9, Kutno

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.