

Enterol 250 mg x 10 kapsułek INPHARM

Cena: 21,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	INPHARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	Saccharomyces boulardii
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Enterol, lek probiotyczny, 10 kapsułek

Saccharomyces boulardii CNCM I-745

IMPORT RÓWNOLEGŁY - InPharm

Skład:

- **Substancją czynną leku są** - liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii CNCM I-745
- **Substancje pomocnicze** - laktoza jednowodna, magnezu stearynian; składniki kapsułki żelatynowej: żelatyna, tytanu dwutlenek

1 kapsułka zawiera 250 mg drożdżaków.

Wskazania:

- leczenie ostrych biegunek infekcyjnych

- zapobieganie biegunkom poantybiotykowym
- nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem
- zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym
- zapobieganie biegunkom podróżnych.

Działanie:

- utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej jest niezbędne dla zapewnienia istotnych czynności przewodu pokarmowego, takich jak: trawienie, odporność na infekcje oraz wzmocnienie naturalnej odporności. Równowaga flory bakteryjnej jest jednak delikatna i może być zaburzona przez wiele czynników: zakażenia przewodu pokarmowego zarówno wirusowe, jak i bakteryjne, przyjmowanie niektórych leków, w tym antybiotyków, zmiana nawyków żywieniowych. Może to powodować szereg problemów trawiennych prowadzących do biegunek.
- Enterol jest lekiem wpływającym na florę jelitową, tzw. „substytutem naturalnej flory”, który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci:

- **ostra biegunka infekcyjna:** 1 do 2 kapsułek na dobę, przez okres do 1 tygodnia
- **biegunka poantybiotykowa:** 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii
- **biegunka spowodowana zakażeniem *C. difficile*:** 4 kapsułki na dobę, przez okres do 4 tygodni
- **biegunka związana z żywieniem dojelitowym:** 1 do 2 kapsułek na dobę
- **biegunka podróżnych:** 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.
- **Stosować doustnie.** Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody. kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość wsypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka

U dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na możliwość zadławienia; zaleca się otwieranie kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu

Przeciwwskazania:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej
- pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością lub hospitalizowani z powodu ciężkich chorób lub zaburzeń układu odpornościowego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10000 osób):

- odnotowano kilka przypadków wzdęć

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

- wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd, reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, wysypka na całym ciele (osutka), przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia).

Częstość nieznaną: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaparcia, ciężkie zakażenie krwi (posocznica)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- nie należy stosować leku jednocześnie z innymi doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjenta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn

Lek Enterol zawiera laktozę jednowodną:

- jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Enterol z jedzeniem, pić i alkoholem:

- lek Enterol zawiera żywe komórki, z tego powodu nie należy mieszać go ze zbyt gorącymi (ponad 50°C) lub zimnymi płynami, potrawami i alkoholem, ponieważ mogłoby to zniszczyć komórki drożdży

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Chronić przed wilgocią.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Grecja kraj eksportu: Petsiavas A.E.Ag. Anargyron Grecja

Wytwórca:

Biocodex 1 avenue Blaise Pascal Francja

Importer równoległy: InPharm Sp. z o.o. ul. Strumykowa 28/11 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.