


Enterol Forte, probiotyk 500 mg x 14 saszetek



Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Biocodex
Substancja czynna	Saccharomyces boulardii
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Enterol forte lek probiotyczny 500 mg - 14 saszetek

(Saccharomyces boulardii CNCM I-745)

Opis produktu:

Enterol Forte 500 mg jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii, które zaliczane są do probiotyków, czyli żywych mikroorganizmów, które przynoszą korzyści zdrowotne dla organizmu gospodarza.

Lek Enterol Forte 500 mg wpływa na florę jelitową i jest tzw. „substytutem naturalnej flory”, który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia

Skład:

- Substancja czynna - 500 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii CNCM I-745
- Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat Tutti-frutti

Jedna saszетка zawiera liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces boulardii* co odpowiada 500 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745

Wskazania:

- leczenie ostrych biegunek infekcyjnych
- w zapobieganiu biegunkom spowodowanych zażywaniem antybiotyków
- jako dodatek do leczenia metronidazolem lub wankomycyną przy nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem *C.difficile*
- w zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym i biegunkom podróжным

Działanie:

- **Enterol Forte** wpływa na florę jelitową, jest tzw. "substytutem naturalnej flory", który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt stosować doustnie. Zawartość saszетки należy wsypać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, wymieszać i natychmiast wypić. Proszek z saszетки można także mieszać z pokarmem. Należy pamiętać aby woda lub pokarm nie były zbyt gorące

- **Ostra biegunka infekcyjna:** 1 do 2 saszettek na dobę przez okres do 1 tygodnia
- **Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków oraz choroby zapalne jelit:** 1 do 2 saszettek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii
- **Działania niepożądane podczas eradykacji *H. pylori*:** 1 do 2 saszettek na dobę
- **Biegunka spowodowana zakażeniem *C. difficile*:** 2 saszетки na dobę przez okres do 4 tygodni

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- występuje alergia na drożdżaki, w szczególności *Saccharomyces boulardii*
- pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej
- pacjent jest w stanie krytycznym lub jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób):

- wzdęcia

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):

- reakcje alergiczne: świąd, powstawanie bąbli (pokrzywka), wysypka, osutka miejscowa lub obejmująca całe ciało, obrzęk tkanki łącznej twarzy (obrzęk naczynioruchowy), reakcja anafilaktyczna a nawet wstrząs, przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia)

Interakcje:

- należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować
- nie należy stosować leku Enterol Forte jednocześnie z innymi doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi (leki stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie zaleca się otwierania saszetek w pobliżu pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej, aby zapobiec niepożądaną kolonizacji grzybów na cewnik, zwłaszcza przeniesieniu przez zanieczyszczone ręce. Istnieją doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach fungemii (penetracji grzybów do krwi) z towarzyszącą gorączką i dodatnim wynikiem posiewu z krwi, nawet u pacjentów nieleczonych *Saccharomyces boulardii*. We wszystkich opisanych przypadkach fungemia ustąpiła po zastosowaniu leczenia przeciwgrzybiczego lub, gdy było to konieczne, po usunięciu cewnika z żyły centralnej.

Jako uzupełnienie leczenia zaleca się:

- nawodnienie organizmu (rehydratację) - w tym celu należy spożywać duże ilości słonych lub słodkich napojów, aby wyrównać straty płynów spowodowanych biegunką (średnie dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na wodę wynosi 2 litry),
- utrzymanie odpowiedniego reżimu żywieniowego - zaleca się spożywanie grillowanego mięsa i ryżu, wykluczenie z diety niektórych pokarmów, takich jak: owoce, zielone warzywa, pikantne potrawy, mrożona żywność, schłodzone napoje. Należy rozważyć ograniczenie spożywania mleka i pokarmów mlecznych.

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku:

- braku poprawy po 2 dniach leczenia
- wystąpienia wymiotów, gorączki
- pojawienia się krwi lub śluzu w stolcu
- uczucia wzmożonego pragnienia, suchości języka - to objawy rozpoczynającego się odwodnienia, czyli utraty znacznej ilości płynów w wyniku biegunki. Należy poradzić się lekarza, który zdecyduje o konieczności rehydratacji doustnej lub dożylniej

Ciąża, karmienie piersią:

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem

Ciąża:

- nie zaleca się stosowania produktu Enterol Forte w czasie ciąży

Laktacja:

- *Saccharomyces boulardii* nie wchłania się do mleka matki. Ze względu na brak danych, zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem produktu Enterol Forte w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- **nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży**

Stosowanie leku i jedzeniem i picciem:

Enterol Forte zawiera żywe komórki. Z tego powodu nie należy mieszać go ze zbyt gorącymi (ponad 50°C) lub zimnymi płynami, potrawami i alkoholem, ponieważ mogłoby to zniszczyć komórki drożdży

Lek zawiera laktozę**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Biocodex 94250 Gentilly, Francja

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.