

Enterol, probiotyk 250 proszek x 10 saszetek

Cena: 26,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Biocodex
Substancja czynna	Saccharomyces boulardii
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Enterol lek probiotyczny - 10 saszetek

(Saccharomyces boulardii CNCM I-745)

Opis produktu:

Enterol 250 to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym zawierającym drożdżaki Saccharomyces boulardii

Skład:

- Substancja czynna - liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii CNCM I-745
- Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), aromat **owocowy**

1 saszетка zawiera 250 mg drożdżaków

Wskazania:

- leczenie ostrych biegunek infekcyjnych
- w zapobieganiu biegunkom spowodowanych zażywaniem antybiotyków
- jako dodatek do leczenia metronidazolem lub wankomycyną przy nawracającej bieguncie spowodowanej zakażeniem *C.difficile*
- w zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym i biegunkom podróznym

Działanie:

- lek ma na celu wzmocnienie naturalnej flory przewodu pokarmowego oraz ochronę nabłonka jelit
- jego stosowanie pomaga skutecznie odbudować niezbędne do życia bakterie jelitowe, które często giną pod wpływem antybiotyków

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego. Zawartość saszetki należy dodać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, wymieszać i wypić

Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci:

- ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 saszetek na dobę przez okres do 1 tygodnia
- biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 saszetek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii
- biegunka spowodowana zakażeniem *C. difficile*: 4 saszetki na dobę przez okres do 4 tygodni
- biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 saszetek na dobę
- biegunka podróznych: 1 do 4 saszetek na dobę przez okres do 1 tygodnia.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- preparatu nie poleca się stosować u osób z założonymi wkłuciami do żyły centralnej oraz ze znacznie zmniejszoną odpornością lub hospitalizowanych z powodu ciężkich chorób, lub zaburzeń (osłabienia) układu odpornościowego
- ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób):

- wzdęcia

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):

- wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd
- reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy
- wysypka na całym ciele (osutka)

Interakcje:

- nie należy stosować leku Enterol jednocześnie z innymi doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi (leki stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych)
- Enterol zawiera żywe komórki. Z tego powodu nie należy mieszać go ze zbyt gorącymi (ponad 50°C) lub zimnymi płynami, potrawami i alkoholem, ponieważ mogłoby to zniszczyć komórki drożdży

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **lek zawiera laktozę** - nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy
- **lek Enterol zawiera fruktozę** - nie należy stosować leku u pacjentów z nietolerancją fruktozy

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku
- Saccharomyces boulardii nie wchłania się do mleka matki. Ze względu na brak danych, zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem leku Enterol w okresie karmienia piersią

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Biocodex 94250 Gentilly, Francja

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.