

## Enterol probiotyk 250mg lek probiotyczny, 10 kapsułek



Cena: 33,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Biocodex
Substancja czynna	Saccharomyces boulardii
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Enterol lek probiotyczny - 10 kapsułek

(Saccharomyces boulardii CNCM I-745)

### Opis produktu:

Enterol 250 to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym zawierającym drożdżaki Saccharomyces boulardii

### Skład:

- Substancja czynna - liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii CNCM I-745
- Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, magnezu stearynian; składniki kapsułki żelatynowej: żelatyna, tytanu dwutlenek

1 kapsułka zawiera 250 mg drożdżaków

### Wskazania:

- leczenie ostrych biegunek infekcyjnych
- w zapobieganiu biegunkom spowodowanych zażywaniem antybiotyków
- jako dodatek do leczenia metronidazolem lub wankomycyną przy nawracającej bieguncie spowodowanej zakażeniem C.difficile
- w zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym i biegunkom podróжным

## Działanie:

- lek ma na celu wzmocnienie naturalnej flory przewodu pokarmowego oraz ochronę nabłonka jelit
- jego stosowanie pomaga skutecznie odbudować niezbędne do życia bakterie jelitowe, które często giną pod wpływem antybiotyków

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci w przypadku:

- ostrej biegunki infekcyjnej: 1 do 2 kapsułek na dobę, przez okres do 1 tygodnia
- biegunki poantybiotykowej: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii
- biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 4 kapsułki na dobę, przez okres do 4 tygodni
- biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułek na dobę
- biegunka podróжных: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia
- lek stosować doustnie
- kapsułkę należy połknąć, popijając szklanką wody.
- kapsułkę można również otworzyć, a jej zawartość wysypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej
- u pacjentów w stanie krytycznym lub u pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób):**

- wzdęcia

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):**

- wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd
- reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy
- wysypka na całym ciele (osutka)

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **lek zawiera laktozę** - nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

**Dzieci i młodzież:**

- u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na możliwość zadławienia

**Ciąża, karmienie piersią:**

- 

w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem

**Ciąża:**

- 

nie zaleca się stosowania produktu Enterol 250 w czasie ciąży

**Laktacja:**

- 

Saccharomyces boulardii nie wchłania się do mleka matki. Ze względu na brak danych, zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem produktu Enterol 250 w okresie karmienia piersią

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Biocodex 94250 Gentilly, Francja

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.