

Envil gardło, ból gardła, 20 tabletek do ssania



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Cetylpyridinium, Lidocainum, Zincum czynna
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Envil gardło - 20 tabletek do ssania

(Cetylpyridinii chloridum, lidocaini hydrochloridum monohydricum, zinci gluconas)

Opis produktu:

Envil gardło - tabletki do ssania, do stosowania pomocniczo w anginie.

Skład:

- **substancją czynną jest** - chlorek cetylopirydynowy, chlorowodorek lidokainy, cynk glukonian.
- **substancje pomocnicze** - mentol, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylpirolidon, aspartam, kwas cytrynowy bezwodny, kroscarmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian, glicerol 99,5%.

1 tabletkę zawiera:

- 1,5 mg chlorku cetylopirydynowego,
- 1,0 mg chlorowodorku lidokainy
- 17,42 mg cynku glukonianu (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku).

Wskazania:

- Leczenie stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.
- pomocniczo w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych przebiegających z bólem gardła,
- w zapaleniu migdałków (angina).

Działanie:

Ma działanie antyseptyczne (odkażające) i miejscowo znieczulające.

Zawiera trzy substancje czynne:

- **chlorek cetylopirydyniowy** - który działa odkażająco, bakteriobójczo oraz przeciwgrzybiczo
- **chlorowodorek lidokainy** - który znieczula miejscowo, łagodząc ból
- **glukonian cynku** - który wspomaga system odpornościowy organizmu

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** ssać powoli 1 tabletkę co 1 lub 2 godziny. Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.
- **Dzieci od 6. roku życia:** ssać powoli 1 tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę.
- nie przyjmować leku w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed lub po posiłku.

Tabletkę należy ssać powoli w jamie ustnej.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek
- jeśli pacjent choruje na methemoglobinemię
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

- miejscowe reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- ciężkie reakcje skórne, takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione; pokrzywka; nadwrażliwość na światło słoneczne; ból głowy; zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka); wymioty, metaliczny smak w ustach; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

- nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- drgawki

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Leku Envil gardło nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić

- Nie należy przyjmować leku podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem, ze względu na ryzyko zachłyśnięcia
- Lek najlepiej przyjmować godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku
- Należy zachować ostrożność podczas picia gorących napojów i jedzenia gorących pokarmów
- Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, wzrasta ryzyko oparzenia błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła
- Podczas stosowania leku Envil gardło nie należy spożywać produktów mlecznych, ponieważ zmniejszają one wchłanianie cynku
- Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i nie powinien być stosowany u pacjentów chorych na fenyloketonurię
- Lek zawiera mannitol, który może powodować podrażnienie żołądka oraz biegunkę

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.