

Erdomed Muko, proszek do sporządzenia zawiesin, stan zapalny nosa, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli, 10s



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Angelini Pharma
Substancja czynna	Erdosteinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Erdomed Muko 225 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej - 20 saszetek

(Erdosteinum)

Opis produktu:

Erdomed Muko to lek sekretolityczny, który zmniejszając lepkość śluzu ułatwia usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych. Erdomed Muko jest produktem leczniczym stosowanym jako środek wspomagający leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych, z gęstą wydzieliną np. stan zapalny nosa, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli czy płuc.

Skład:

Substancją czynną leku jest erdosteina (Erdosteinum).

Substancje pomocnicze: sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemu dwutlenek, sukraloza (E 955), kwas jabłkowy bezwodny, aromat pomarańczowy [maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzujące (w tym, między innymi cytral, alkohol benzyłowy, linalol), ?-tokoferol (E 307)].

1 saszетка zawiera 225 mg erdosteiny.

Wskazania:

- Erdomed Muko stosuje się w leczeniu wspomagającym ostrych i przewlekłych chorób zapalnych dróg oddechowych: zatok, nosa, tchawicy, krtani, oskrzeli i płuc, którym towarzyszy uczucie zatłoczonych zatok, mokry kaszel i nadprodukcja gęstego, lepkiego śluzu.

Działanie:

- Erdomed Muko zawiera erdosteinę. Zmniejsza lepkość śluzu w drogach oddechowych i ułatwia jej wykrztuszenie.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka 2 razy na dzień.

Dorośli: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę.

Lek do stosowania doustnego. Po wymieszaniu zawartości saszetki w 120 ml (około pół szklanki) wody o temperaturze pokojowej, powstaje rzadka, mętna zawiesina, którą należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Ze względu na działanie wykrztuśne leku, nie należy go stosować przed snem. W przypadku gdy po 3 dniach terapii pacjent czuje się gorzej albo nie nastąpiła poprawa wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Przeciwwskazania:

- Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników czy substancje zawierające wolne grupy SH (np. acetylocysteina).
- Nie stosować leku w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, niewydolnością nerek czy homocystynurią.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

•

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy.

•

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zgaga, zaparcie, biegunka, suchość jamy ustnej, zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie.

•

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): brak odczuwania smaku lub zaburzenia smaku, objawy alergii: wysypka, pokrzywka, gorączka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli wystąpią symptomy nadwrażliwości, typu wysypka, pokrzywka, to należy przerwać stosowanie leku.
- W przypadku osób z zaburzeniami oczyszczania rzęskowego albo osłabionym odruchem kaszlowym należy ostrożnie stosować lek.
- Erdomem Muko zawiera glukozę i sacharozę (3,5 g w 1 saszetce), dlatego diabetycy powinni zwrócić na to uwagę, natomiast pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem powinni skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera alkohol benzylowy (0,01 mg na saszetkę) i sól (23 mg w każdej saszetce).
- Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne.

Dzieci i młodzież:

- Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

-

Nie należy stosować leku Erdomed Muko w czasie ciąży oraz karmienia piersią

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Erdomed muko może wchodzić w interakcje z lekami przeciwkaszlowymi, osłabiając odruch kaszlu - mogą one utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., Aleje jerozolimskie, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.