


## Esberitox N, 0,215 ml/tabletkę, 40 tabletek



Cena: 25,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG
Substancja czynna	Baptisiae tinctoriae radice extractum spissum, Echinacea purpurea, Thujae occidentalis herba extractum spissum
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Esberitox N, 0,215 ml/tabletkę, 40 tabletek

Extractum spissum ex: (Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba)

### Skład:

**Substancją czynną leku** jest wyciąg z: ziela żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki purpurowej i korzenia dzikiego indygo - Extractum spissum ex: (Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba) (1:11), ekstrahent: etanol 30% (v/v.)

**1 tabletkę zawiera:** 0,215 ml alkoholowo-wodnego wyciągu (1:11) odpowiadającego:

- Baptisiae tinctoriae radice - 10 mg
- Echinaceae purpureae radice - 7,5 mg
- Thujae occidentalis herba - 2 mg
- ekstrahent: etanol 30% (v/v)

**Substancje pomocnicze:** laktoza, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza

## Wskazania:

- Produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

## Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą lub rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae, np. rumianek, arnikę.
- Istnieją zasadnicze przyczyny do niestosowania leku w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne.
- Nie stosować w przypadku immunosupresji (np. w przypadku terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).
- Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.

## Działanie:

- W badaniach klinicznych u ludzi Esberitox N łagodził objawy i skracał czas trwania choroby w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

- 3 razy dziennie po 3 tabletki.

### Dzieci:

- **Dzieci od 6 do 12 lat:** 3 razy dziennie po 2 tabletki.
- **Dzieci od 4 do 6 lat:** 3 razy dziennie po 1 tabletkę.

Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone, dlatego w przypadku stosowania należy zachować szczególną ostrożność

### Sposób podawania:

- Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą.
- W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę, zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu.
- Możliwe jest również ssanie tabletek.

- Leczenie powinno być rozpoczęte możliwie szybko po wystąpieniu objawów i kontynuowane do czasu ich ustąpienia, nie dłużej jednak niż 10 dni

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości.
- Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka). Brak danych dotyczących częstości występowania tych działań niepożądanych.
- Podczas stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę (Echinacea) obserwowano przypadki wysypki skórnej, świądu, obrzęki twarzy, skrócenia oddechu, zawrotów głowy i obniżenia ciśnienia krwi.
- U szczególnie wrażliwych pacjentów nie jest wykluczone wystąpienie szoku anafilaktycznego

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

**W ulotce dla pacjenta zawarto następujące ostrzeżenia:**

- Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzielinę, należy skontaktować się z lekarzem.

**Substancje pomocnicze:**

- Lek zawiera laktozę i sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tabletek Esberitox N

## Dzieci i młodzież:

- Nie zaleca się stosowania produktów zawierających jeżówkę u dzieci do 12 lat.
- Pomimo, iż produkt zawiera jeżówkę, uwzględniając dane własne dla tego produktu dopuszcza się jego stosowanie u dzieci poniżej 12 lat, należy jednak zachować szczególną ostrożność

## Wpływ na płodność, ciążę i laktację:

**Ciąża i karmienie piersią:**

- Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

**Płodność:**

- Brak danych klinicznych dotyczących wpływu na płodność.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie badano. Uważa się, że lek nie osłabia zdolności psychomotorycznych, zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30oC.
- Chronić od światła.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

## Podmiot odpowiedzialny:

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 35

38259 Salzgitter, Niemcy

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.