

# Esberitox N, infekcje x 100 tabletek

Cena: 58,50 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Schaper & Brummer
Substancja czynna	Baptisiae tinctoriae radice extractum spissum, Echinacea purpurea, Thujae occidentalis herba extractum spissum
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Esberitox N - 100 tabletek

## Opis produktu:

Esberitox N to produkt leczniczy roślinny w postaci tabletek stosowany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg

## Skład:

- **Substancja czynna** - alkoholowy wyciąg z ziela żywotnika zachodniego (*Thujae occidentalis herba*), korzenia jeżówki purpurowej (*Echinaceae purpureae radice*), korzenia dzikiego indygo (*Baptisiae tinctoriae radice*)
- **Substancje pomocnicze** - laktoza, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza

1 tabletkę zawiera 0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego: *Baptisiae tinctoriae radice* 10mg, *Echinaceae purpureae radice* 7,5 mg, *Thujae occidentalis herba* 2 mg

## Wskazania:

- **Esberitox N** jest przeznaczony do leczenia przeziębień, jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg

## Działanie:

- Stymulacja układu immunologicznego

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

- 3 razy dziennie po 3 tabletki

### Dzieci od 6 do 12 lat:

- 3 razy dziennie po 2 tabletki

### Dzieci od 4 do 6 lat:

- 3 razy dziennie po 1 tabletkę

Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą

W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę, zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu. Możliwe jest również ssanie tabletek

**Leczenie powinno być rozpoczęte możliwie szybko po wystąpieniu objawów i kontynuowane do czasu ich ustąpienia, nie dłużej jednak niż 10 dni**

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- jeśli pacjent ma uczulenie na ziele żywotnika zachodniego, korzeń jeżówki purpurowej, korzeń dzikiego indygo lub na rośliny pokrewne jeżówce, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (Compositae/Asteraceae – np. rumianek, arnika), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne
- w przypadku immunosupresji
- u dzieci poniżej 4 lat

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Podczas stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę obserwowano:

- wysypkę na skórze, świąd, obrzęk twarzy, duszności, zawroty głowy i spadek ciśnienia krwi

Brak danych dotyczących częstości występowania:

- zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka)

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli objawy choroby nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera laktozę i sacharozę (cukier). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Ciąża, karmienie piersią:

- Lek Esberitox N nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Schaper Brummer GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 35 38259 Salzgitter, Niemcy

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.