

Esceven, żel 30g



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Substancja czynna	Aesculus hippocastanum, Heparinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Esceven (83,5 mg+50 j.m.)/g żel, 30g

(Hippocastani seminis extractum spissum + Heparinum Natricum))

Opis produktu:

- Esceven w postaci żelu jest produktem leczniczym tradycyjnie stosowanym w objawach przewlekłej niewydolności żyłnej, takich jak: ból, uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Skład:

Substancje czynne:

- Wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum spissum; DER: 6-9:1
- ekstrahent: metanol 90 % (v/v)) - 83,5 mg/g
- Heparyna sodowa (Heparinum natricum) - 50 j.m./g

Substancje pomocnicze:

- Karbomer, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol

Wskazania:

- Esceven w postaci żelu jest produktem leczniczym tradycyjnie stosowanym w objawach przewlekłej niewydolności żyłnej, takich jak: ból, uczucie ciężkości w nogach, nocne skurcze mięśni łydki, swędzenie oraz obrzęk.
- Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

- 1 g żelu (pasek żelu o długości ok. 3 - 4 cm) wcierać w skórę kończyn 3 razy dziennie. Stosować przez okres 2 tygodni.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować żelu Esceven, jeśli występuje nadwrażliwość na składniki produktu.
- Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicy oczu, w stanach przewlekłych schorzeń nerek.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Może pojawić się przejściowe uczucie ciepła, przejściowy świąd skóry o niewielkim nasileniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując Esceven u pacjentów ze skazą krwotoczną.
- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.
- Bronopol może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).
- Etylu parahydroksybenzoesan może wywołać reakcje alergiczne (mogą być spóźnione).
- W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi lub dostania się produktu w okolice oczu, przemyć wodą.

Ciąża i karmienie piersią:

- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn

Dzieci:

- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania produktu u dzieci.

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Dotychczas nie stwierdzono istotnych interakcji z innymi lekami

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań,

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.