

Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja, 30 ml



Cena: 24,40 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-Chemie AG
Substancja czynna	Simeticonum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja - 30 ml

(Simeticonum)

Opis produktu:

Lek Espumisan® 100 mg/ml to emulsja w postaci kropli, która może być stosowana u niemowląt i dzieci. Zawiera wysokie stężenie symetykonu – substancji czynnej, która zwalcza dolegliwości żołądkowo-jelitowe związane z nadmiernym gromadzeniem gazów, w tym kolikę niemowlęcą.

Skład:

- Substancja czynna - symetykon
- Substancje pomocnicze - makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, kwas sorbinowy, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420), karbomer, sodu cytrynian, aromat bananowy, woda oczyszczona.

1 ml emulsji do stosowania doustnego zawiera 100 mg symetykonu.

Wskazania:

- **leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych** związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęć lub nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym.
- **wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej** (np. badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz badań endoskopowych jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

Działanie:

- Łagodzenie wzdęć poprzez zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu, co powoduje ich pęknięcie.
- Uwolnione gazy są lepiej wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego dzięki ruchom perystaltycznym jelit.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Zalecana dawka to:

Bez konsultacji z lekarzem w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym:

- **Niemowlęta:** 5–10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią
- **1–6 lat:** 10 kropli 3 do 5 razy na dobę
- **6–14 lat:** 10 do 20 kropli 3 do 5 razy na dobę
- **Młodzież i dorośli:** 20 kropli 3 do 5 razy na dobę

Przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej zgodnie z zaleceniami lekarza - 1 ml 3 razy na dobę w przeddzień badania, po posiłkach i 1 ml rano, w dniu badania.

Jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego po konsultacji z lekarzem - 2 ml do 4 ml na 1 litr środka kontrastowego stosowanego podczas badania z podwójnym kontrastem.

Przed badaniem żołądka i jelita cienkiego (endoskopia) po konsultacji z lekarzem - 2 do 3 ml przed badaniem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tego leku.

Interakcje:

- Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku pojawienia się nowych dolegliwości konieczna jest wizyta u lekarza.
- Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.
- Jeśli dolegliwości nie ustąpiły w tym czasie, należy zwrócić się do lekarza.
- Zawiera sól.

Dzieci i młodzież:

- W przypadku stosowania leku u niemowląt i dzieci, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie z jedzeniem i pićem:

- Brak szczególnych wymagań.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Lek ten można stosować przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

Podmiot odpowiedzialny:

Berlin-Chemie AG, (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.

Import równoległy - InPharm Sp. z o.o.

Kraj - Rumunia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.