

Espumisan Easy, granulki, 14 saszetek



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-Chemie AG
Substancja czynna	Simeticonum
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Espumisan Easy, granulki bez popijania - 14 saszetek

Opis produktu:

Espumisan Easy zawiera substancję czynną symetykon, który jest środkiem stosowanym w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych oraz pomocniczo w badaniach diagnostycznych.

Skład:

- Substancja czynna - symetykon
- Substancje pomocnicze - sorbitol, talk, kwas jabłkowy, aromat cytrynowy, aromat kremowy.

1 saszetka zawiera 125 mg symetykonu.

Wskazania:

- w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia;
- w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym;
- w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.

Działanie:

- Substancja czynna leku - symetykon **powoduje pękanie pęcherzyków gazu zawartych w masie pokarmowej i w śluzie przewodu pokarmowego**. Gazy uwolnione w tym procesie mogą być następnie wchłaniane przez ścianę jelita i usuwane w wyniku ruchów jelit.
- Symetykon **wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe** i nie wchodzi w jakiegokolwiek reakcje chemiczne. Jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną.
- Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmienionej.

Dawkowanie:

- **Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia** - powinni zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po posiłku. W razie potrzeby zawartość 1 saszetki można także zażyć przed pójściem spać. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć, zażywając jednorazowo 2 saszetki. Dawka dobową nie powinna przekraczać 8 saszetek, co odpowiada 1000 mg symetykonu.
- **Dzieci w wieku od 6 do 14 lat** - powinny zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po posiłku. W razie potrzeby zawartość 1 saszetki można także zażyć przed pójściem spać. Dawka dobową nie powinna przekraczać 3 saszetek, co odpowiada 375 mg symetykonu.

Espumisan Easy jest bardzo wygodny w stosowaniu. Należy wysypać granulki bezpośrednio na język i połknąć. W razie potrzeby można popić je wodą.

Espumisan Easy należy przyjmować do ustąpienia dyskomfortu, ale nie dłużej niż przez 30 dni. Jeżeli dyskomfort nie ustąpi w ciągu 30 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

- Zawiera sorbitol - jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję cukrów, przed zażyciem wyrobu medycznego Espumisan Easy należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku długotrwałych i niewyjaśnionych dolegliwości brzusznych zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych.

Interakcje:

- Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Dzieci i młodzież:

- Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Ważne:

- **Wyrób medyczny.**
- Posiada oznakowanie CE 0197
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim.**
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim.**