

Espumisan Max, 20 kapsułek



Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-Chemie AG
Substancja czynna	Simeticonum
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Espumisan Max - 20 kapsułek miękkich

Espumisan Max to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym (wzdęcia, ucisk, uczucie pełności).

Skład:

- Substancja czynna - symetykon
- Substancje pomocnicze - żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa, czerwony tlenek żelaza.

1 kapsułka zawiera 140 mg symetykonu.

Wskazania:

- w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia;
- w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym;
- w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastrokopii.

Działanie:

- Substancja czynna leku - symetykon **powoduje pękanie pęcherzyków gazu zawartych w masie pokarmowej i w śluzie przewodu pokarmowego**. Gazy uwolnione w tym procesie mogą być następnie wchłaniane przez ścianę jelita i usuwane w wyniku ruchów jelit.
- Symetykon **wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe** i nie wchodzi w jakiegokolwiek reakcje chemiczne. Jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną.
- Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmienionej.

Sposób użycia:

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów:

- Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia - 1 kapsułka w trakcie lub po posiłku. Dawka dobową nie powinna przekroczyć 5 kapsułek.

w przygotowaniu do badań diagnostycznych:

- Dorośli i dzieci powyżej 14. roku życia - w dniu poprzedzającym badanie - 2 kapsułki. w dniu badania - 1 kapsułka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie zawiera cukru i może być stosowany u osób cierpiących na cukrzycę.
- Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Dzieci i młodzież:

- Nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14. roku życia.

Ciąża, karmienie piersią:

- Z reguły symetykon można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią bez ograniczeń, gdyż jest wydalany z jelit w postaci niezmienionej i nie wchłania się do organizmu.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0481
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.