

Excedrin Migra Stop x 20 tabletek powlekanych

Cena: 38,99 PLN



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Producent / Marka | GlaxoSmithKline |
| Substancja czynna | Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Excedrin Migrastop - 20 tabletek powlekanych

Opis produktu:

Doraźne leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury

Skład:

- **Substancja czynna** - kwas acetylosalicylowy, paracetamol i kofeina
- **Substancje pomocnicze** - hydroksypropyloceluloza niskopodsta-wiona, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, Opadry YS-1 -7086 (hypromeloza 3 cP, hyprome-loza 6 cP, hypromeloza 50 cP, tytanu dwut.JenekiEIJI), glikol propylenowy), kwas benzoesowy (E210), wosk Carnauba

1 tabletkę zawiera:

- kwas acetylosalicylowy 250 mg

- paracetamol 250 mg
- kofeina 65 mg

Wskazania:

- **Excedrin MigraStop** jest stosowany w doraźnym leczeniu bólu głowy oraz napadów migreny (objawów takich jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk oraz zaburzenia codziennego funkcjonowania) z aurą lub bez aury

Działanie:

- **Kwas acetylosalicylowy i paracetamol** - zmniejszają ból i gorączkę działa przeciwzapalnie
- **Kofeina** jest łagodnym środkiem pobudzającym i zwiększa działanie kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Leczenie bólu głowy

- **Dorośli: 1 tabletkę popić pełną szklanką wody**

W razie konieczności kolejną tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej

W przypadku bardziej intensywnego bólu głowy można wziąć jednorazowo 2 tabletki, w razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin od zażycia dwóch pierwszych tabletek.

Leczenie migreny

- **Dorośli: 2 tabletki popić szklanką wody.**

W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki zachowując 4-6 godzin odstęp między dawkami.

Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Nie należy stosować leku Excedrin MigraStop:

- jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników tabletek powlekanych Excedrin MigraStop
- jeśli stwierdzono kiedykolwiek reakcje alergiczne na inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe, takie jak diklofenak lub ibuprofen
- u pacjentów z owrzodzeniem żołądka, jelit, lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego
- jeżeli występuje krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowo-jelitowych)

- w przypadku hemofilii lub występowania innych chorób krwi
- w ciężkich schorzeniach serca, wątroby lub nerek,
- podczas przyjmowania ponad 15 mg metotreksatu tygodniowo (patrz punkt Excedrin MigraStop a inne leki)
- w trzecim trymestrze ciąży

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często (występują u 1 na 10 pacjentów):

- nerwowość, zawroty głowy
- nudności, dolegliwości w obrębie jamy brzusznej

Niezbyt często (występują u 1 na 100 pacjentów):

- bezsenność, drżenie, odrętwienie, ból głowy
- uczucie suchości w jamie ustnej, biegunka, wymioty
- zmęczenie, uczucie zaniepokojenia
- przyspieszone bicie serca

Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów):

- ból gardła, trudności z przełykaniem, odrętwienie i mrowienie dookoła ust, nadmierne wydzielanie śliny
- zmniejszony apetyt, zaburzenia smaku
- niepokój, nastrój euforyczny, uczucie napięcia
- zaburzenia uwagi, utrata pamięci, zaburzona koordynacja
- uczucie bólu w okolicy czoła i policzków
- ból oczu, zaburzenia widzenia
- uderzenia gorąca, problemy z naczyniami obwodowymi (np. w rękach lub nogach)
- krwawienie z nosa, płytki i spowolniony oddech, katar
- wzdęcia, odbijanie się
- nadmierne pocenie się, swędzenie, swędząca wysypka, zwiększona wrażliwość skóry,
- sztywność mięśni, kości lub stawów, ból szyi, ból pleców, kurcze mięśni
- osłabienie, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

Częstość nieznaną (nie może zostać określona na podstawie posiadanych danych):

- niepokój, złe lub inne niż zwykle samopoczucie
- senność, migrena
- zaczerwienienie skóry, wysypka, odnotowywano bardzo rzadkie przypadki występowania poważnych reakcji skórnych
- kołatanie serca, duszność, nagła trudność w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech lub kaszel (objawy astmy)
- ból brzucha, dolegliwości ze strony układu pokarmowego występujące po posiłkach
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
- obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa
- problemy z nerkami

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

- inne leki zawierające paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub jakiegokolwiek inne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
- leki przeciwzakrzepowe („leki rozrzedzające krew”)
- kortykosteroidy (stosowane w leczeniu zapaleń)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:**Stosowanie leku z jedzeniem i pić:**

- **Alkohol:** Należy zapytać lekarza czy można przyjmować lek Excedrin MigraStop lub inne leki przeciwbólowe/przeciwgorączkowe, przy spożywaniu 3 lub więcej napojów alkoholowych dzień
- **Kofeina:** Zawartość kofeiny w zalecanej dawce leku odpowiada zawartości około jednej filiżanki kawy. Podczas stosowania leku, należy ograniczyć spożycie leków, żywności lub napojów zawierających kofeinę, ponieważ zbyt duża jej dawka może powodować nerwowość, drażliwość, bezsenność, a w niektórych przypadkach również podwyższenie tętna

Ciąża, karmienie piersią:

- W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy się skonsultować z lekarzem
- Nie stosować leku Excedrin MigraStop podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, ze względu na możliwość uszkodzenia płodu lub trudności podczas porodu
- Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ może to być niebezpieczne dla niemowlęcia

Wpływ na badania laboratoryjne:

- Excedrin MigraStop należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które mogą zaburzać płodność. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu stosowania leków z grupy NLPZ

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności, nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.